سلسلة الدليل الميداني

طيور العلا

طيور العلا

ARTE E CIÊNCIA

العلا
ALULA

العلا
ALULA

سلسلة الدليل الميداني:

طيور العلا

سلسلة الدليل الميداني:

طيور العلا

Jaime Sousa, Ana P. Coelho, Andreia Silva, Nafee Alothyqi,
Ahmed Taheri, Pedro Tarroso, and José Carlos Brito

سلسلة الدليل الميداني: طيور العلا

المؤلفون
خايمي سوزا، آنا ب. كويلو، أندريا سيلفا، نافي العتيقي، أحمد الطاهري، بيدرو تاروسو، وجوزيه كارلوس بريتو
التنسيق
دوارتي فاسكونسيلوس غونسالفيس، ليلي خلاتباري، باربرا سانتوس، غلام حسين يوسفي، خوسي كارلوس بريتو
التقديم
لورينس فان إيسن
الترجمة
أحمد الطاهري، نافع العذيقي
المراجعون
لازلو باتكو، أيمن عبد الكريم، عبد العزيز السعيد، لورنس فان إيسن، بنجامين يي هان لي
المراجعة اللغوية
جاين ويلكنسون
تصميم الغلاف والصفحات
أنطونيو خوسيه بيدرو
تصميم الغلاف والصفحات
أنطونيو خوسيه بيدرو
الغلاف ورسومات الأنواع
دافينا فالكاو
الطبعة الأول
xxxx/2024
ردمك
978-989-36005-2-8
تم الطباعة في المملكة العربية السعودية بواسطة
شركة سروات للطباعة والنشر
الاقتباس
Sousa, J., Coelho, A.P., Silva, A., Alothyqi, N., Taheri, A., Tarroso, P., and Brito J.C. (2024). Birds of AlUla (Trans. N. Alothyqi and A. Taheri). In: Gonçalves, D.V., Khalatbari, L., Santos, B., Yusefi, G.H., and Brito, J.C. (2024). Field Guide Series – Fauna of AlUla.

هذا الكتاب هو نتاج للجهود التعاونية في إطار مشروع "حصر النباتات والحيوانات في العلا". نتوجه بالشكر لكل زملائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الذين ساهموا في هذه السلسلة. يشمل ذلك أعضاء قسم السياحة لدعمهم، وكذلك الجوّالين الذين ساعدوا في جمع البيانات.

حقوق الطبع والنشر © 2024 محفوظة للهيئة الملكية لمحافظة العلا.
كل الحقوق محفوظة.
لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه أو إرساله بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة، بما في ذلك النسخ أو التسجيل أو الطرق الإلكترونية أو الميكانيكية الأخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الناشرين. لطلبات الإذن، يرجى الاتصال بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.

WHERE SCIENCE IS ART

ARTE E CIÊNCIA

Editorial Direction
Nuno Ferrand de Almeida
Pedro Beja
Editorial Consultant
Jorge Reis-Sá
Editorial Coordination
Carla Morais Pires

BIOPOLIS – Program in genomics biodiversity and land planning
CIBIO
Campus de Vairão
Vairão 4485-661
Tel. (+351) 252 660 400

Editorial Direction
Nuno Ferrand de Almeida
Editorial Consultant
Jorge Reis-Sá
Editorial Coordination
Carla Morais Pires
Helena Gonçalves
Maria João Fonseca

Museu de História Natural e da Ciência
Universidade do Porto
Praça Gomes Teixeira
Porto 002-4099
Tel. (+351) 220 408 050

ARTE E CIÊNCIA

العلا ALULA

Royal Commission for AlUla
BIOPOLIS/CIBIO-InBIO/BIODESERTS

BIODESERTS cibio BIOPOLIS العلا ALULA

المحتويات

1.	المقدمة	10
2.	كيفية استخدام هذا الدليل	12
3.	خريطة العلا	15
4.	النطاق الجغرافي والمناخ والموائل	21
5.	المصطلحات والاختصارات ورموز الخرائط	26
6.	تصنيف الطيور	29
7.	طبوغرافيا الطيور	31
8.	توثيق الأنواع	35
9.	مناطق الطيور المهمة	155
10.	قائمة أنواع الطيور في العلا	156
11.	المراجع	163
12.	الفهرس	165

تمهيد

بصفتي مدير الأبحاث في قسم الحياة البرية والتراث الطبيعي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يسعدني كثيرا أن أقدم الدليل الميداني لطيور العلا. هذا الكتاب، بالإضافة إلى الدلائل الأخرى، هو نتاج جهود تعاونية دامت 24 شهرًا بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومجموعة أبحاث بيوبولس (BIOPOLIS/CIBIO-InBIO, BIODESERTS). تُعد هذه الدلائل نتاج المشروع الطموح لحصر المجموعة الحيوانية في العلا، الذي يهدف إلى إنشاء سجل دقيق لثروات التنوع البيولوجي لهذه المنطقة الاستثنائية.

هذا الكتاب، المنسق بخبرة عالية، هو شهادة على الشغف والفضول الذي أبداه الفريق تجاه العالم الطبيعي، والرغبة العميقة في فهم آليات عمل الطبيعة. غالبًا ما تكون الأمور غير المتوقعة أو المحيرة أو المفاجئة هي التي تشعل خيالنا، وتلهمنا للمثابرة كل يوم في الميدان، وتقودنا إلى أفكار واكتشافات جديدة. هناك أماكن قليلة متبقية في العالم للاكتشاف، حيث توجد صفحات فارغة في سِجِل التنوع الحيوي.

العلا، المملكة العربية السعودية، هي واحدة من تلك الأماكن.

تقف محافظة العلا في المملكة العربية السعودية شاهدة على النسيج الغني للتاريخ البشري والعجائب الطبيعية. وتتميز مناظرها الطبيعية بجبالها الرملية الشاهقة وبقايا النشاط البركاني الواسع، وقد كانت مهدًا للحضارات التي تعود إلى آلاف السنين. شهدت

المنطقة صعود وسقوط الثقافات القديمة مثل الدادانيين، والليحيانيين، والأنباط، مما خلف وراءه إرثًا من العجائب المعمارية والنقوش التي تزين منحدراتها الوعرة.

على الرغم من غنى التاريخ الثقافي للعلا، كان التنوع الحيوي للمحافظة غير موثق إلى حد كبير حتى انطلق مشروع "حصر المجموعة الحيوانية في العلا" في رحلة لاستكشاف التنوع البيولوجي لهذه المنطقة الفريدة. قام الفريق المخصص بإجراء مسوحات شاملة عبر 541 موقعًا، مستخدمين منهجيات متنوعة، مما أسفر عن جمع مذهل لأكثر من 31000 ملاحظة رصد، وكشف عن تنوع المجموعة الحيوانية في العلا بتفاصيل غير مسبوقة.

كانت نتائج هذا المسعى مذهلة وكاشفة في آن واحد. تم توثيق ما مجموعه 622 وحدة تصنيفية في محافظة العلا، 59% منها تُسجل لأول مرة، سواء على مستوى محافظة العلا، أو على مستوى المملكة العربية السعودية، أو حتى ضمن السجلات العلمية العالمية.

بالتالي، تم تجميع سلسلة واسعة النطاق من الدلائل الميدانية لتحديد الثدييات والطيور والزواحف واللافقاريات في المنطقة لمشاركة اكتشافاتنا مع العالم. ستنضم سلسلة الدلائل الميدانية إلى الدلائل الموجودة بالفعل حول جيولوجيا العلا والاستخدامات التاريخية للنباتات في محافظة العلا. الهدف من نشر هذه الدلائل الميدانية المتنوعة هو أن تكون موارد لا تقدر بثمن للباحثين وممارسي الحفاظ على التنوع البيولوجي وهواة الطبيعة على حد سواء.

تلتزم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالحفاظ على التدبير المستدام للموارد الطبيعية في محافظة العلا، بالتوازي مع الحفاظ على الكنوز الثقافية والتاريخية، لأجيال قادمة.

ندعوكم لزيارة العلا واستكشاف جمالها الطبيعي عن قرب. نتمنى أن تكون هذه الدلائل

الميدانية رفيقة لكم خلال مغامرتكم، مما يثري فهمكم للتنوع البيولوجي الرائع الذي يحيط بكم.

لورينس فان إيسين
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
قسم الحياة البرية والتراث الطبيعي
مدير الأبحاث والاستشارات

1. المقدمة

هذا الدليل الميداني هو أول تقييم شامل ومفصل للطيور في محافظة العلا والمناطق المجاورة لها، ويتضمن معطيات أصلية بخصوص تنوع الطيور وتوزيعها وثرائها في محافظة العلا. في المجمل، تم توثيق مجموعة من 165 نوعاً من الطيور ووصفها في هذا الدليل. تم استقاء البيانات لهذا الدليل الميداني من خلال مراجعة ببليوغرافية دقيقة وأكثر من ستة أشهر من العمل المكثف في الميدان والمختبر من قبل المؤلفين. على الرغم من أن المنطقة تحتضن أنواعًا إضافية من الطيور، خاصة خلال فترة الهجرة، مثل العوسق *Falco naumanni*، ونقشارة بونلي الشرقية *Phylloscopus orientalis*، وصرد تركستان الأكحل *Lanius phoenicuroides*، والدُخَّلة المخططة *Curruca nisoria*، والدُخَّلة الأورفية الشرقية *Curruca crassirostris*، فإن إدراجها في هذا الدليل كان محدودًا بسبب ندرة مشاهدتها خلال العمل الميداني وعدم التأكيد من المصادر الببليوغرافية المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأمطار الغزيرة، تنشأ برك مؤقتة تجتذب الطيور المائية المهاجرة مثل الكرسوع أسود الجناحين (أبو المغازل) *Himantopus himantopus*، والطيطوى الشائع *Actitis hypoleucos*، والطيطوى الأخضر *Tringa ochropus*. بسبب عدم انتظام هذه الأحداث، لم تُدرج العديد من هذه الأنواع في الدليل الميداني. الغرض الأساسي من هذا العمل هو توفير أداة عملية مجدية للتعرف على طيور محافظة العلا، يمكن أن يستخدمها المبتدئون وكذلك من قِبَل المتخصصين في علم الطيور.

تقع محافظة العلا في شمال غرب شبه الجزيرة العربية، في المملكة العربية السعودية، وتندرج بأكملها ضمن النطاق البيئي الباليارکتي (المنطقة القطبية الشمالية القديمة). تتألف معظمها من الصحاري والأحراش الجافة (الأراضي الشجيرية الجافة) وتحتل موقعاً جغرافياً أحيائياً استثنائياً في المنطقة الانتقالية بين خمسة أقاليم بيئية ونقطتين ساخنتين عالميتين للتنوع الحيوي. بسبب هذا الموقع الجغرافي المتميز، يُتوقع وجود تنوع كبير في النباتات والحيوانات، خاصة في الأنواع المتكيفة مع البيئة القاحلة. من بين 517 نوعًا من الطيور المعروفة بوجودها في المملكة العربية السعودية، هناك 14 نوعًا مستوطنًا في المنطقة ونوع واحد مستوطن في المملكة، وهو العقعق العربي. وإلى جانب هذا، يُعد تسعة عشر نوعًا آخر من الطيور مهددة على المستوى العالمي. على الرغم من ذلك، فإن المعرفة المتاحة حول تنوع الطيور وتوزيعها في محافظة العلا لا تزال محدودة. لهذه الأسباب، دعمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطوير قائمة جرد الطيور في المنطقة.

تعد العلا نموذجاً فريداً للتعايش بين الموروث الإنساني والطبيعي. وبتزايد سريع، أصبحت وجهة عالمية مميزة للسياح الذين يسعون نحو تجارب فريدة ومناظر طبيعية استثنائية للأراضي الجافة. كما تعتبر مثالاً بارزاً للمبادرات العالمية التي تروّج للتنمية المستدامة، وذلك من خلال الدمج بين التراث الثقافي والطبيعي في بيئة متكاملة ومتناغمة. وفي إطار تحقيق رؤية السعودية 2030، يشمل برنامج التنمية الذي وضعته الهيئة الملكية لمحافظة العلا مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات علم الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون. وتتضمن العناصر الأساسية للمشروع حفظ التراث الثقافي والموارد الطبيعية والسياحة، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة العلا. في هذا الإطار، يهدف هذا الدليل الميداني إلى توفير أداة عمل لرصد الأنواع وتطوير برامج الأبحاث والأنشطة السياحية.

تلقى المؤلفون خلال إعداد هذا الدليل الميداني المساعدة من العديد من الأشخاص، جميعهم قدموا تشجيعاتهم ونصائحهم القيمة، نود أن نتوجه بالشكر الخاص إلى: أندريه فيستي ليز، باربارا سانتوس، ديوغو فيريرا، دوارتي غونسالفيش، فرانسيسكو ألفاريس، فولفيو ليكاتا، ج. حسين يوسفي، هوغو ريبيلو، لاسلو باتكو، ليلي خلطباري، مارغريتا لاكوشيتش، مارتينا بانيسي، محمد درويش، نونو فيراند، صوفيا روزا، فيداك لاكوشيتش، يوري سيمون، زبيسيك بوراتينسكي، وحراس المناطق المحمية لجمع ملاحظاتهم القيمة حول الطيور، دافينا فالكاو لتوفير الرسوم التوضيحية المتميزة التي ترافق هذا الدليل الميداني، نينا سيرين، أنا راموس، صوفيا موراو، باتريشيا ريبيرو، ديانا كاسترو، سارا جواو وسوزانا لوبيس لمساعدتهم في العمل المخبري، وعلاء الدين سلطان، أيمن عبد الكريم، إنغريد ستيرنمان، لاسلو باتكو، والهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل عام، لدعمهم في تطوير العمل الميداني في محافظة العلا. نود أيضًا أن نشكر أهالي وسكان محافظة العلا على دعمهم وضيافتهم. وأخيرًا وليس آخرًا، يود المؤلفون أن يشكروا بشكل خاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا على التكليف بإعداد هذا الدليل والإشراف عليه.

2. كيفية استخدام هذا الدليل

تم تصميم الدليل الميداني بحيث يوفر معلومات عامة عن محافظة العلا وعن الطيور، يليها وصف وتوضيح لجميع الأنواع المسجلة حتى الآن.

يقدم الفصلان الثالث والرابع نظرة عامة شاملة عن السياق الجغرافي والبيئي للعلا، ويصفان تضاريسها ومناطقها الأحيائية وموائلها المتنوعة، والظروف المناخية والطقسية، والمناطق المحمية المحددة.

يلي ذلك مسردٌ بالمصطلحات وقائمة بالمختصرات التي ستساعد في تصفح الدليل (الفصل الخامس)، ونظرة عامة على بيولوجيا الطيور وتنوعها (الفصل السادس)، مع التركيز على الفصائل والأنواع الموجودة في محافظة العلا، وقسم مصور (الفصل السابع) سيسترشد به القراء في الخطوات الأولى لتحديد الطيور على مستوى الفصيلة والجنس، من خلال استخدام السمات المظهرية التشخيصية ذات الصلة.

يحتوي الفصل الثامن على معلومات مفصلة مصحوبة برسوم توضيحية لـ 165 نوعًا من الطيور التي تم رصدها في محافظة العلا. تم إدراج هذه الأنواع وفقًا للترتيب الفيلوجيني المقدم في الفصل السادس. لكل نوع، يتم عرض:

- الاسم العربي الشائع والاسم العلمي (اللاتيني)؛
- التوزيع العالمي، بما في ذلك معلومات عن سلوك الهجرة للأنواع (مقيمة، مهاجرة أو جزئياً مهاجرة، مع تقديم تفاصيل حول مناطق وجودها خلال فترة الشتاء بالنسبة للأنواع المهاجرة)؛
- التوزيع في العلا، بما في ذلك المناطق المحمية التي تم رصد النوع فيها. بالنسبة للأنواع التي لم تتم ملاحظتها داخل المناطق المحمية، يتم تقديم مؤشر تقريبي لمكان الملاحظة؛
- خريطة تتضمن توقعات باحتمالية وجود النوع في محافظة العلا. تم رسم خرائط احتمالات الوجود لكل نوع استنادًا إلى تعريف "الغلاف المناخي"، أي مجموعة الظروف المناخية التي من المتوقع أن يوجد فيها النوع حيث تكون الاحتياجات البيئية ملائمة لعيشه وبقائه. وفي الحالة الراهنة، تم تحديد الغلاف المناخي بناءً على مؤشر الفرق المعياري للغطاء النباتي ودرجة حرارة سطح الأرض المستمدة من الاستشعار عن بُعد في المناطق التي توجد فيها الأنواع حاليًا في محافظة العلا.

تم تقدير معدل كل متغير بناءً على بيانات الرصد لكل نوع وتم تعيينها كاحتمالات حدوث بدقة مكانية تبلغ كيلومترًا واحدًا؛

- قياسات جسم الطائر (الطول الكلي للجسم والوزن)، بالإضافة إلى طول الجناحين للأنواع التي غالبًا ما تُرى وهي تحلق، مثل الطيور الجارحة (النهارية والليلية)، واللقالق، والغربان، والسنونو، والخطافات؛
- أهم السمات المحددة للنوع، مثل الريش والخصائص المورفولوجية، بما في ذلك الاختلافات المحتملة بين الجنسين والفئات العمرية؛
- المواطن المألوفة والعادات، بما في ذلك النظام الغذائي والسلوك، ونوع النشاط (نهاري أو شفقي أو ليلي)؛
- تقييم الوفرة بحيث يشير إلى احتمالية مصادفة كل نوع في البرية، استنادًا إلى عدد المواقع التي تمت ملاحظة النوع فيها. الفئات المستخدمة هي: وفير (ملاحظ في أكثر من 30 موقعًا)، شائع (من 16 إلى 30 موقعًا)، غير شائع (من 7 إلى 15 موقعًا)، قليل (من 2 إلى 6 مواقع)، نادر (موقع واحد فقط)، وغير مُقَيَّم (عندما تعذر تحديد الوفرة). تم إجراء تعديلات على الوفرة عند الضرورة لتمثيل أفضل لنوع معين. على سبيل المثال، بعض الأنواع، على الرغم من تقييمها بمستوى وفرة منخفض بسبب مشاهدتها في عدد قليل من المواقع، يمكن أن تكون متعددة إقليميا (مثل البلبل الأغشى، الموجود في تيماء، وجبل الود وواحة العلا، والعصفور الصخري الشاحب في حرة خيبر). يمكن أن تمتلك نفس الأنواع عدة درجات من الوفرة في المنطقة، واحدة لكل حالة (انظر أدناه) مثل: الرخمة بوفرة: نادر، قليل، نادر؛
- حالة الأنواع في المنطقة: مقيمة، مهاجرة عابرة، مهاجرة متكاثرة وزائرة شتوية. يمكن أن تكون لنفس الأنواع عدة حالات في المنطقة، على سبيل المثال: الرخمة بحالة مقيم، مهاجر عابر، زائر شتوي؛
- حالة الحفظ وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، التي جرى تقييمها على الصعيدين العالمي والإقليمي. تم تحديد حالة الحفظ على المستوى الإقليمي استنادًا إلى أحدث تقييم متاح لطيور شبه الجزيرة العربية (Symes et al. 2015)؛

يحدد الفصل التاسع المناطق المهمة للحفاظ على الطيور في محافظة العلا بناءً على توزيع ثراء أنواع الطيور بدقة مكانية تبلغ كيلومترًا واحدًا. تم حساب تقدير ثراء الأنواع من خلال جمع خرائط التوزيع الفردية بالنسبة لكل نوع مقدم في الفصل الثامن.

يقدم الفصل العاشر قائمة مرجعية لمختلف أنواع الطيور التي تم رصدها في العلا، بما في ذلك الأسماء العلمية للأنواع والأسماء الشائعة وحالة الحفظ عالميًا وإقليميًا.

أخيرًا، يختتم هذا الدليل بتقديم قائمة المراجع الببليوغرافية (الفصل 11) وفهرس الأنواع (الفصل 12).

تم الاعتماد في إعداد هذا الدليل على البيانات الناتجة عن الأبحاث الميدانية التي قام بها فريق البحث BIODESERTS والمراجع المتاحة. شمل العمل الميداني أربع بعثات علمية (في نوفمبر/ديسمبر 2022، ويناير/مارس 2023، ومايو/يونيو 2023، وأكتوبر/نوفمبر 2023) لجمع بيانات توزيع الأنواع في 120 موقعًا تغطي مختلف الظروف المناخية المميزة لمحافظة العلا على مدار السنة، وبالتالي تمثيل التباين في أنماط نشاط الطيور عبر المواسم المختلفة. شمل مخطط أخذ العينات الميدانية التباين البيئي في محافظة العلا. تم إجراء "استطلاعات المعاينة البصرية" والتعداد في الصباح الباكر، وأواخر الظهيرة، وهي الأوقات التي تكون فيها الطيور أكثر نشاطًا، إما من أجل البحث عن الطعام أو الدفاع عن مناطقها. من أجل تحديد أنواع الطيور الليلية، تم اعتماد التسجيل الصوتي. كما تم جمع علامات أخرى لوجود الطيور وتحديدها، مثل الفضلات والبيض المتخلى عنه.

بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الشباك الضبابية لاستهداف الأنواع الأقل وضوحًا، وتم تحديد جنس جميع الأفراد المُلتقطة وأعمارها (يافعة أو بالغة) كلما كان ذلك ممكنًا، وتم جمع قياسات الجسم، والتقاط صور مرجعية. علاوة على ذلك، تم جمع بيانات التوزيع من المراجع المتاحة، وقواعد البيانات عبر الإنترنت (مثل بوابة بيانات مرفق المعلومات العالمي حول التنوع الحيوي GBIF)، ومن المتعاونين المحليين.

3. خريطة العلا

تقع محافظة العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتتميز بوجود موائل مهمة ومتميزة وغنية من حيث التنوع النباتي والحيواني (**الشكل 1**). لضمان حماية التراث الطبيعي في المنطقة، تم إعلان 5 محميات طبيعية في حرة عويرض ووادي نخلة والغراميل وحرة الزبن وشرعان، إلى جانب مناطق أخرى ذات أهمية بيئية وتراثية تشمل جبل نهر وجبل الورد، وجبل شيهوب، وحرة خيبر (منتزه جيولوجي وطني)، وكذلك واحات العلا، وخيبر القديمة وتيماء (**الجدول 1**).



الشكل 1 | الموقع الجغرافي للعلا، المناطق الحضرية الرئيسية، والمناطق المحمية للحفاظ على المعالم الطبيعية والتراث البيئي في المحافظة.

الجدول 1 | المناطق المحمية في محافظة العلا.

الاختصار	الاسم	الفئة	المساحة (كم²)
HUBR	حرة عويرض	محمية الغلاف الحيوي	4680
WNNR	وادي نخلة	محمية طبيعية	1602
GNR	الغراميل	محمية طبيعية	2115
HZNR	حرة الزبن	محمية طبيعية	1677
SNR	شرعان	محمية طبيعية	1550
HKNA	حرة خيبر	منتزه جيولوجي وطني	600
JNAH	جبل نهر	منطقة حفظ خاصة	883
JWAR	جبل الورد	منطقة حفظ خاصة	251
JSHA	جبل شيهوب	منطقة حفظ خاصة	174
OKHA	خيبر القديمة	منطقة حفظ خاصة	56
ALUO	واحة العلا	منطقة حفظ خاصة	10
TAYM	تيماء	منطقة حفظ خاصة	6

يعرض الشكل 2 مجموعة من الصور التي تُمثل مختلف المناظر الطبيعية الموجودة ضمن المناطق المحمية بالعلا.

حرة عويرض: فوهة بركان رملية - الموقع 023



حرة عويرض: وادي في هضبة بازلتية صخرية - الموقع 001

وادي نخلة: وادي رملي وتلال صخرية - الموقع 080

وادي نخلة: وادي رملي وتكوينات صخرية بارزة - الموقع 075

الغراميل: صحراء رملية وتكوينات من الحجر الرملي - الموقع 057

الغراميل: تكوينات صخرية بارزة في الصحراء الرملية - الموقع 044

حرة الزبن: وادي صخري وتكوينات صخرية بارزة - الموقع 097

حرة الزبن: هضبة صخرية وتكوينات صخرية بارزة - الموقع 095

شرعان: وادي رملي وتكوينات من الحجر الرملي - الموقع 070

شرعان: وادي رملي وتكوينات من الحجر الرملي - الموقع 059

جبل نهر: وادي رملي – الموقع AH060

جبل نهر: تكوينات بازلتية - الموقع 128



حرة خيبر: هضبة بازلتية - الموقع 144

حرة خيبر: وادي صخري في هضبة بازلتية - الموقع 143

جبل الورد: هضبة بازلتية - الموقع 198

جبل الورد: وادي صخري في جبل بازلتي - الموقع 118

جبل شيهوب: واد صخري في جبل البازلت - الموقع 122

جبل شيهوب: وادي صخري في جبل بازلتي - الموقع 119

خيبر القديمة: قنوات الري في الواحة - الموقع 140

خيبر القديمة: واحة – الموقع 140

واحة العلا: واحة - الموقع 153

واحة العلا: واحة - الموقع 150

تيماء: سبخة - الموقع 136

تيماء: واحة - الموقع 136

الشكل 2 | صور للمناظر الرئيسية الموجودة في المناطق المحمية في محافظة العلا والطيور التي يمكن العثور عليها في كل موقع.

حرة عويرض	S001:	صرارة (*C. gallicus*)، هازجة سردينية (*C. melanocephala*)، سمنة صخرية زرقاء (*M. solitarius*)، عصفور إسباني (*P. hispaniolensis*)، نقشارة سيبيرية (*P. tristis*)،
	S023:	صدى (*A. noctua*)، غراب أدرع (*C. ruficollis*)، ضوعة (*O. tristramii*)، بومة الصحراء (*S. hadorami*).
وادي نخلة	S075:	باشق أوراسي (*A. nisus*)، حجل عربي (*A. melanocephala*)، زوراء شائعة (*C. communis*)، هازجة سردينية (*C. melanocephala*)، هازجة صحراوية آسيوية (*C. nana*)، نسر أوراسي (*G. fulvus*)، سنونو شائع (*H. rustica*)، ذعرة صفراء (*M. flava*)، حميراء شائعة (*P. phoenicurus*)، كدرية حجازية (*P. lichtensteinii*)، خطاف رملي (*R. riparia*)،
	S080:	يمامة برية (*C. livia*)، صُرَد كبير (*L. excubitor*).
الغراميل	S044:	مكاء (*A. alaudipes*)، حمرة صبغاء (*A. cinctura*)، عقاب سهبية (*A. nipalensis*)، بوهة صحراوية (*B. ascalaphus*)، أبلق أغشى شرقي (*O. hispanica*)، صرارة (*C. gallicus*)، مرزة مستنقعية (*C. aeruginosus*)، هازجة صحراوية آسيوية (*C. nana*)، صقر أسحم (*F. concolor*)، سمنة صخرية زرقاء (*M. solitarius*)، أبلق أغشى شرقي (*O. hispanica*)، هازجة حدائقية (*S. borin*)،
	S057:	مكاء (*A. alaudipes*)، دخناء زيتونية شرقية (*I. pallida*)، الدخلة أبو قلنسوة (*S. atricapilla*)، هازجة حدائقية (*S. borin*).

حرة الزين	S095:	باشق أوراسي (*A. nisus*)، جشنة صحماء (*A. campestris*)، عقاب بونلي (*A. fasciata*)، كدرية حجازية (*P. lichtensteinii*)، الدخلة أبو قلنسوة (*S. atricapilla*)،
	S097:	حجل عربي (*A. melanocephala*)، تمير عربي (*C. hellmayri*)، هازجة عربية (*C. leucomelaena*)، قراع عربي (*D. dorae*)، بومة الصحراء (*S. hadorami*).
شرعان	S059:	باشق أوراسي (*A. nisus*)، حجل شائع (*A. chukar*)، بوهة صحراوية (*B. ascalaphus*)، صرارة (*C. gallicus*)، شقراق أوروبي (*C. garrulus*)، صقر أسحم (*F. concolor*)، دخناء زيتونية شرقية (*I. pallida*)، رخمة (*N. percnopterus*)، حمرة صحراوية (*O. deserti*)، برقش (*S. torquatus*)،
	S070:	سمامة فاتحة (*A. pallidus*)، الغراب مروحي الذيل (*C. rhipidurus*)، سمنة صخرية زرقاء (*M. solitarius*)، حميراء سوداء (*P. ochruros*)، بومة الصحراء (*S. hadorami*).
جبل نهر	S128:	حسون كزبري (*B. githagineus*)، هازجة رأساء (*C. mystacea*)، صُرَد كبير (*L. excubitor*)، حمحم (*O. capensis*)، أبلق مقلنس (*O. monacha*)، بومة الصحراء (*S. hadorami*)،
	AH060:	هازجة صحراوية آسيوية (*C. nana*)، أبلق حزين شرقي (*O. lugens*).
حرة خيبر	S143:	قبرة صبيعاء صغيرة (*A. rufescens*)، عقاب مذهبة (*A. chrysaetos*)، قُبَّرة صُبَيْعاء كبيرة (*C. brachydactyla*)، سماني شائعة (*C. coturnix*)، هامة (*M. alba*)، ذعرة صفراء (*M. flava*)،
	S144:	نسر مسود (*A. monachus*)، قبرة صبيعاء صغيرة (*A. rufescens*)، جشنة صحماء (*A. campestris*)، صدى (*A. noctua*)، قبرة الصحراء المقرنة (*E. bilopha*)، نسر أوراسي (*G. fulvus*)، هامة (*M. alba*)، حمرة صحراوية (*O. deserti*)، أبلق درجي (*O. isabellina*)، أبلق شمالي (*O. oenanthe*)، نقشارة الصفصاف (*P. trochilus*).
جبل الورد	S118:	حجل عربي (*A. melanocephala*)، عقاب بونلي (*A. fasciata*)، النسر الا سود (*A. verreauxii*)، تمير عربي (*C. hellmayri*)، هازجة عربية (*C. leucomelaena*)، بومة الصحراء (*S. hadorami*)،
	S198:	صدى (*A. noctua*)، عصفور الشمس الفلسطيني (*C. osea*)، نقشارة صفراء الحاجب (*P. inornatus*)، دخلة صفصافية (*P. trochilus*).
جبل شيهوب	S119:	سمامة فاتحة (*A. pallidus*)، تمير عربي (*C. hellmayri*)، هازجة رأساء (*C. mystacea*)، عوسق (*F. tinnunculus*)، صُرَد كبير (*L. excubitor*)، قارية خضراء (*M. cyanophrys*)،
	S122:	حجل عربي (*A. melanocephala*)، قراع عربي (*D. dorae*)، دخناء زيتونية شرقية (*I. pallida*)، بومة الصحراء (*S. hadorami*).
خيبر القديمة	S140:	ماينا شائع (*A. tristis*)، رفراف شائع (*A. atthis*)، بلشون أرجواني (*A. purpurea*)، بلشون مذهب (*A. ralloides*)، سبد مصري (*C. aegyptius*)، السبد النوبي (*C. nubicus*)، شوالة (*C. galactotes*)، سوادية (*C. podobe*)، قضي منقار أفريقي (*E. cantans*)، فرفر شائع (*G. chloropus*)، رفراف أصدر (*H. smyrnensis*)، سوداء (*H. ampelinus*)، ذعرة رمادية (*M. cinerea*)، صفارية أوراسية (*O. oriolus*)، حميراء شائعة (*P. phoenicurus*)، الدخلة أبو قلنسوة (*S. atricapilla*)، هامة (*M. alba*).
واحة العلا	S150:	درة مطوقة (*A. krameri*)، بلنصي عربي (*A. squamiceps*)، سوادية (*C. podobe*)، غداف (*C. rhipidurus*)، تبشر (*P. galbula*)،
	S153:	قمري أوروبي (*S. turtur*)، بلنصي عربي (*A. squamiceps*)، سوادية (*C. podobe*)، غراب أدرع (*C. ruficollis*)، ضوعة (*O. tristramii*)، نمنمة ذنوب (*P. gracilis*).
تيماء	S136:	باشق أوراسي (*A. nisus*)، دخناء أوراسية (*A. scirpaceus*)، درة مطوقة (*A. krameri*)، بلشون أرجواني (*A. purpurea*)، شوالة (*C. galactotes*)، عقاب مسيرة (*H. pennatus*)، سنونو شائع (*H. rustica*)، صُرد صغير (*L. minor*)، زرقاء زور (*L. svecica*)، قارية زرقاء الخدين (*M. persicus*)، حدأة سوداء (*M. migrans*)، عقيب العسل أوربية (*P. apivorus*)، بلبل أغشى (*P. leucotis*)، حسون صحراوي (*R. obsoleta*)، خطاف رملي (*R. riparia*)، برقش (*S. torquatus*)، الدخلة أبو قلنسوة (*S. atricapilla*)، قطقاط أشوك (*V. spinosus*).

4. النطاق الجغرافي والمناخ والموائل

تقع محافظة العلا في القطاع الشمالي من سلسلة جبال الحجاز في شبه الجزيرة العربية، وتحديدًا بين دائرتي العرض 25°30' و27°40' شمالاً، وخطي الطول 37°00' و40°50' شرقاً. تغطي المنطقة مساحة تقدر بنحو 22500 كم^2، وحوالي 50٪ من هذه المساحة تقع ضمن مناطق محمية. توجد محافظة العلا بأكملها ضمن النطاق البيئي الباليارکتي (المنطقة القطبية الشمالية القديمة)، وتتألف معظمها من الصحاري والأراضي الشجيرية الجافة (الأحراش الجافة) كنطاق إحيائيي. كما تتميز بموقع بيوجغرافي استثنائي في المنطقة الانتقالية بين أربع مناطق بيئية: الصحراء العربية وصحراء شمال الجزيرة العربية والأحراش الصحراوية للبحر الأحمر والصحاري والأحراش الجافة. بالإضافة إلى ذلك، تنتمي أجزاء من جبل الورد إلى المنطقة الإحيائية للغابات المتوسطية والغابات الحرجية والأحراش، وهي جزء من المنطقة البيئية الخامسة المتمثلة في الغابات الصنوبرية عريضة الأوراق في شرق البحر المتوسط. تقع محافظة العلا في منتصف المسافة بين نقطتين ساخنتين للتنوع الأحيائي العالمي: حوض البحر المتوسط والقرن الأفريقي (الذي يشمل قسمًا في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية).

التضاريس

تهيمن سلسلة جبال الحجاز على المناظر الطبيعية في محافظة العلا، حيث يصل ارتفاع قممها إلى 1958 مترًا في حرة خيبر، و1940 مترًا في جبل الورد، و1711 مترًا في حرة عويرض (**الشكل 3**). تتميز المناطق المحمية الواقعة في جبال الحجاز بأنها غير متجانسة طبوغرافياً، حيث يفوق فارق الارتفاع 1000 متر في كل من حرة عويرض وحرّة الزبن وجبل الورد وجبل شيهوب وجبل نهر (بين المناطق المنخفضة والقمم الجبلية). على العكس من ذلك، تقع واحات العلا وخيبر القديمة وتيماء على ارتفاع يتراوح بين 600 متر و800 متر، وهي عموماً مناطق مستوية، تمتد على طول مجاري الأودية. وتقع محميات الغراميل وشرعان ووادي نخلة في أقصى الشمال الغربي لصحراء النفود الكبير، حيث يتراوح ارتفاعها بين 650 و1500 متراً.



الشكل 3 | خريطة الارتفاع في محافظة العلا؛ محافظة العلا (مضلع رمادي)، المناطق الحضرية الرئيسية (نقاط سوداء)، والمناطق المحمية (مضلعات بيضاء).

المناخ

تعتبر محافظة العلا واحدة من أكثر المناطق القاحلة في شبه الجزيرة العربية. في مدينة العلا، يتميز الصيف بكونه طويلاً وشديد الحرارة والجفاف والصفاء، بينما يكون الشتاء قصيراً وبارداً وجافاً وغالباً ما يكون صافياً. تتراوح درجة الحرارة الوسطى عادةً بين حد أدنى يبلغ 3 درجات مئوية وحد أقصى يصل إلى 38 درجة مئوية، ونادرًا ما تقل عن صفر درجة مئوية أو تزيد عن 40 درجة مئوية. يستمر الموسم الحار أربعة أشهر، من يونيو إلى سبتمبر، مع متوسط حرارة يومية عظمى تزيد عن 35 درجة مئوية. الأشهر الأكثر سخونة هي أغسطس وسبتمبر، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والدنيا 20-22 درجة مئوية. يستمر الموسم البارد ثلاثة أشهر، من ديسمبر إلى فبراير، مع متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية يقل عن 24 درجة مئوية. أبرد أشهر السنة هما يناير وفبراير، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة الدنيا 4 إلى 5 درجات مئوية، والعظمى 21 إلى 22 درجة مئوية. لا يوجد تباين موسمي كبير في تواتر الأيام الرطبة (أي الأيام التي يزيد فيها الهطول عن 1 مم). وبالتالي، فإن كمية الأمطار لا تختلف

بشكل كبير على مدار السنة. يتم تسجيل أعلى نسبة هطول في شهر يناير، بمتوسط إجمالي 2,9 مم، يليه ديسمبر وفبراير ومارس، بمتوسط إجمالي 1,7 مم. متوسط إجمالي الهطول من يونيو إلى أغسطس هو صفر مم.

يتبع متوسط درجة الحرارة السنوي داخل محافظة العلا تدرجًا حسب خطوط العرض، حيث تكون المناطق الجنوبية أكثر دفئًا، وقد تصل درجة الحرارة إلى حوالي 26,8 درجة مئوية. في المقابل، تكون المناطق الشمالية أبرد، وقد تنخفض درجة الحرارة فيها إلى حوالي 17 درجة مئوية. وفي المناطق المحمية، يسجل كل من جبل نهر وخيبر القديمة أعلى متوسط سنوي لدرجات الحرارة (حوالي 25 درجة مئوية). على العكس من ذلك، فإن حرة عويرض والغراميل وشرعان وجبل الورد تسجل أدنى متوسطات درجات الحرارة السنوية (حوالي 20-21 درجة مئوية). سُجلت أعلى سعة في متوسط درجات الحرارة السنوية داخل المناطق المحمية في حرة عويرض (5,3 درجة مئوية) وجبل الورد (6,3 درجة مئوية).

يتباين متوسط إجمالي الهطول في محافظة العلا تبعًا للتدرج الطولي. في المناطق الشرقية، التي تتميز برطوبة أعلى، يمكن أن يصل الهطول السنوي إلى حوالي 154 مم. بينما تعد المناطق الغربية أكثر جفافًا، حيث ينخفض الهطول فيها إلى معدلات تقارب 32 مم سنويًا. في المناطق المحمية، يبرز وادي نخلة وحرة خيبر بأعلى متوسطات للهطول، إذ يصل في وادي نخلة إلى 84 مم سنويًا، وفي حرة خيبر إلى 125 مم. في المقابل، يُسجل جبل شيهوب وواحة العلا أقل متوسطات للهطول، بمعدلات 52 مم و60 مم سنويًا على التوالي. أما بالنسبة لسعة متوسط الهطول داخل مناطق الحفظ، فتُسجل أعلى القيم في جبل الورد بمعدل 67 مم سنويًا وحرة خيبر بمعدل 53 مم.

الغطاء الأرضي

تشتمل محافظة العلا على ثماني فئات رئيسية من الغطاء الأرضي (**الشكل 4**): 1) جبال صخرية (32,8٪)، تغطي معظم جبل الورد، وجبل نهر، وجبل شيهوب، وحرة الزبن، وحرة عويرض، والجزء الجنوبي من حرة خيبر، والجزء الجنوبي من وادي نخلة؛ 2) أراضي رملية وصخرية مستوية (30,4٪) تغطي معظم شرعان، والجزء الجنوبي من الغراميل، والجزء الشمالي من وادي نخلة؛ 3) أراضي صخرية مستوية (13,4٪) تغطي المناطق المنخفضة المحيطة بالمناطق الجبلية؛ 4) أراضي رملية مستوية (12,3٪) تغطي الغراميل وشرعان؛ 5) حجر رملي (9,3٪) يغطي معظم الغراميل، وشرعان، والجزء الغربي من حرة عويرض، والجزء الشمالي من وادي نخلة؛ 6) صخور بركانية (1,3٪) تغطي معظم حرة خيبر؛ 7) سبخات (0,3٪) تغطي أجزاء من تيماء؛ 8) واحات (0,2٪) تغطي واحات العلا، وتيماء وخيبر القديمة.



الشكل 4 | الفئات الرئيسية للغطاء الأرضي في محافظة العلا. محافظة العلا (مضلع رمادي)، والمناطق الحضرية الرئيسية (نقاط سوداء) والمناطق الطبيعية المحمية (مضلعات بنية)

التباين البيئي

يرتبط التباين البيئي في محافظة العلا في الغالب بتوفر المياه وأنواع الغطاء الأرضي (**الشكل 5**). يمكن تحديد خمس وحدات بيئية واسعة ضمن المجالات المحمية في محافظة العلا: 1) السهول الشمالية الشرقية القاحلة أو الرملية (اللون الأزرق) التي تهيمن على الغراميل وشرعان والقطاعين الشمالي والشرقي من وادي نخلة؛ 2) المناطق المكسوة بالنبات على امتداد واحات العلا وخيبر القديمة وتيماء وهضاب حرة الزبن (اللون الوردي)؛ 3) مناطق الجبال الجنوبية الغربية لجبل الورد وجبل شيهوب وأجزاء من جبل نهر (اللون الأصفر-الأخضر)؛ 4) جبال حرة الزبن، وحرة عويرض، والقطاع الجنوبي من وادي نخلة (اللون البني -الأخضر)؛ و 5) حقول الحمم البركانية في حرة خيبر (اللون الأزرق الفاتح).



الشكل 5 | التباين البيئي في محافظة العلا ممثلا بالانحدار التوافقي. معاملات الارتباط الموزونة (الموضحة في لوحة الألوان الحمراء والخضراء والزرقاء) التغاير في مؤشر التباين الطبيعي الموحّد (NDVI؛ دقة 250 متر؛ القمر الصناعي MODIS) خلال الفترة من 2011 إلى 2020. محافظة العلا (مضلع رمادي)، المناطق الحضرية الرئيسية (نقاط سوداء) والمناطق الطبيعية المحمية (مضلعات بيضاء)

5. المصطلحات والاختصارات ورموز الخرائط

المصطلحات العلمية والاختصارات ورموز الخرائط المستخدمة في الدليل الميداني.

مسرد المصطلحات:

إبطي: موجود في المنطقة التي يتصل فيها الجناح السفلي بالجسم، والتي تقابل المنطقة تحت الإبط في الإنسان.

أرضي: يعيش على الأرض.

الأجزاء السفلية: المناطق الموجودة على الجانب السفلي من الطائر، تشمل الصدر، والجوانب، والبطن، وأسفل الذيل.

الأجزاء العلوية: المناطق الموجودة في الجانب العلوي للطائر، بما في ذلك العنق، والظهر، والكتفان، والذيل، والجزء العلوي من الذيل.

الجزء الأعلى من الصدر: المنطقة على الحلق وأعلى الصدر تتميز بريش ملون مختلف يشكل نمطًا مميزًا عند الطيور.

الفرخ أو اليافع: صغير الطائر، وُلد في نفس العام، لا يزال يحتفظ بريشه الأول الذي اكتسبه في العش.

الفقاريات: الحيوانات ذات العمود الفقري.

الهجرة: الحركة الموسمية بين مناطق التكاثر ومناطق غير التكاثر.

أمامي: قريب من الجزء الأمامي للجسم (مقدمة الجسد).

أنثى متكاثرة: أنثى تظهر بريش التزاوج.

تبديل الريش: عملية طرح الريش وإعادة نموه.

تغريدة: صوت معقد ومتغير يصدره الطائر، يستخدم عادة لجذب شريك أو الدفاع عن أرضه.

جنس: مرتبة تصنيفية في التصنيف البيولوجي تقع بين مستويات الفصيلة والنوع. يشكّل اسم الجنس الجزء الأول في التسمية الثنائية للنوع.

حَرَّة: منطقة بركانية قديمة تتميز بوجود الحقول الحممية البازلتية التي تكونت نتيجة لانفجارات بركانية.

خَفِيّ: مموه، صعب الرصد أو الاكتشاف.

دخيل: أُدخل إلى بيئة غير موطنه الأصلي ويمكن أن يضر بالنظام البيئي المحلي.

ذكر متكاثر: ذكر يظهر بريش التزاوج.

ريش التزاوج أو التكاثر: ريش مميز يظهر لدى الطائر خلال موسم التزاوج، غالباً ما يكون أكثر تلونًا من مظهره خارج موسم التزاوج.

ريش الشتاء: ريش الطائر خارج فترة التكاثر.

زائرة شتوية: الأنواع التي توجد في المنطقة لقضاء فصل الشتاء، عادة من نوفمبر إلى فبراير.

سبخة: منطقة مسطحة (سهلية) موحلة أو رملية مغطاة بطبقة من الملح، تتكون في أحواض الصرف الداخلية المغلقة أو بالقرب من السواحل، وتكون عادة في المناطق الحارة والجافة.

شفقي: نشط عند الشفق.

صغير أو غير بالغ: طائر لم يظهر بعد الريش المميز للأفراد البالغة.

صوت الطائر: تغريدة قصيرة وبسيطة.

طوق عنقي: بقعة من الريش الملون على حلق الطائر.

طيور اجتماعية المعيشة: طيور تتجمع في أسراب أو مجموعات.

قاحل: جاف جدا.

قزحي الألوان أو متلألئ: يظهر ألوانًا متغيرة تبعًا لزاوية الضوء.

قناع: بقعة داكنة عريضة تحيط بالعين.

لافقاريات: حيوانات بدون عمود فقري.

ليلي: نشط خلال الليل.

متوطن: أصلي أو محصور في منطقة معينة.

مقيم: ساكن أو مستقرفي نفس المنطقة طوال العام.

مهاجر جزئي: نوع يضم عشائرا مهاجرة وعشائرا مقيمة.

مهاجر عابر: نوع يمر عبر الأراضي أثناء الهجرة، عادة بين مارس-مايو (هجرة الربيع) وسبتمبر-أكتوبر (هجرة الخريف).

مهاجر متكاثر: نوع يزور منطقة معينة للتكاثر، عادة ما يُوجد من الربيع إلى الصيف.

نهاري: نشط خلال النهار.

وادي: منفرج بين جبال أو تلال يكون ممرًا للسيل، ويحتوي على مجرى مائي دائم أو مؤقت.

الاختصارات

جم	جرام
سم	سنتيمتر
كم	كيلومتر
مم	ميليمتر
et al.	وآخرون، أي أن هناك مؤلفين آخرين شاركوا في كتابة الورقة البحثية
IUCN	الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
LC	غير مهدد (حسب معايير IUCN)
NA	نوع هامشي، لم يحظ بالتقييم (Symes et al. 2015)
NE	غير مُقَيَّم (حسب معايير IUCN)
VU	معرض للانقراض (حسب معايير IUCN)
WHO	منظمة الصحة العالمية
RE	منقرض إقليميا
NT	قريب من التهديد (حسب معايير IUCN)
EN	مهدد بالانقراض (حسب معايير IUCN)

الرموز

♂	ذكر
♀	أنثى

رموز الخرائط

في خرائط التوزيع لكل نوع نجد ما يلي:

- تظليل باللون الأصفر: مناطق احتمالية وجود الأنواع، حيث تدل درجات اللون الداكنة على احتمالية وجود أعلى.
- مثلثات باللون البرتقالي: المدن.
- مضلع متقطع الخطوط: محافظة العلا.
- مضلعات باللون البني: المناطق المحمية.



6. تصنيف الطيور

يتم إقرار الأسماء التصنيفية للطيور وباقي الحيوانات بالاعتماد على علم تطور السلالات أو ما يسمى بالشجرة الجينية (اعتمادا على موقع النوع في الشجرة الوراثية)، وهو التاريخ التطوري وعلاقة الكائنات الحية ببعضها البعض. قد تتغير الأسماء العلمية للأنواع من وقت لآخر وذلك اعتمادا على ظهور الأدلة العلمية الجديدة المعتمدة على علم الجزيئات والشكل الظاهري للأنواع وبالتالي تحديث موقع النوع في الشجرة الوراثية. في هذا الدليل تم اتباع آخر تحديث لتصنيف الطيور حول العالم (النسخة السابعة) وكذلك كتاب الطيور في العالم المستخدم من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). كما تم عرض تسلسل أنواع الطيور في هذا الدليل اتباعا للقائمة التصنيفية في الكتيب المذكور أعلاه مع بعض التغييرات وذلك لتسهيل المقارنة وتمييز الأنواع المتشابهة. تحت نوع أو نويع وهو مصطلح في التقسيم والتصنيف الأحيائي ويقع تحت النوع مباشرة، وقد تم استخدامه في هذا الدليل في حالة وجود تحت نوع واضح يمكن تمييزه في الجزيرة العربية (على سبيل المثال عقاب سهبية المثال كوبج (*Falco peregrinus pelegrinoides*)).

طائفة الطيور

تعتبر طائفة الطيور إحدى أكثر المجموعات الفقارية تنوعا على الأرض، وتمثل قرابة ثلث أنواع الفقاريات الأرضية. حيث أنها من سلالة الديناصورات وظهرت خلال الحقبة الجوراسية، وتعتبر الطيور حاليا ديناصورات ثنائية القدم ممثلة بأكثر من 10000 نوع حي. تعتبر رتبة الطيور قريبة تصنيفياً وتطورياً من الزواحف، وعلى الرغم من مشاركتها بعض خصائص الزواحف مثل القدرة على وضع البيض (أي أنها حيوانات بيوضة) وكما تغطي القشور أجسامها (أقدامها)، إلا أنها من ذوات الدم الحار وذات إيض أعلى من الزواحف. تكيفت الطيور على قدرتها الحالية على الحركة ونمط التنقل أي الطيران وذلك بسبب خفة وزن عظامها ويعزى ذلك لوجود تجاويف عظمية متعددة، وأن لها فكي منقار (مستدقة) بلا أسنان، كما يغطى الريش أغلب أجسامها. تقطن الطيور كل قارات العالم ولديها القدرة على البقاء والتكاثر في كل النظم البيئية الرئيسية على الأرض. بالإضافة إلى خصائصها الأخرى، يتغير شكلها الظاهري ونظامها الغذائي وسلوكها ووظائف أعضائها للتكيف مع البيئات المختلفة حتى القاسية منها. على سبيل المثال، حين يندر وجود الماء، تستمد الطيور الصحراوية الماء والرطوبة الضرورية للبقاء من خلال الغذاء فقط. كما تتكيف سلوكيا وفسيولوجيا لتقليل فقد الماء خلال عملية تنظيم درجة

حرارة أجسادها. كل هذه الطرق والسمات والقدرات المختلفة من التكييفات الشكلية والسلوكية والفسيولوجية خلقت تباينًا وتغايرًا عاليًا في الطيور حول العالم، فقد تم وصف قرابة الـ 10000 نوع من الطيور حول العالم. حاليا يوجد 517 نوع تنتمي إلى 74 فصيلة من 25 رتبة تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية. في هذا الدليل الميداني لطيور العلا تم تغطية رتب وفصائل الطيور التالية:

- رتبة النعاميات (النعام): سجل منها نوع واحد في العلا.
- رتبة الدجاجيات (حجل، سماني): سجل منها 4 أنواع في العلا تعود لفصيلة واحدة.
- رتبة الحماميات (حمام، يمام): سجل منها 6 أنواع في العلا تعود لفصيلة واحدة.
- رتبة قطويات الشكل (القطا): سجل منها نوع واحد في العلا.
- رتبة السبديات والسماميات (سبد، سمامة): سجل منها 6 أنواع تعود لفصيلتين.
- رتبة الواقواقيات (الوقواق): سجل منها نوع واحد في العلا.
- رتبة الكركيات (مرعة، دجاج الماء): سجل منها نوع واحد في العلا.
- رتبة اللقلقيات (لقلق): سجل منها نوعان في العلا تعود لفصيلة واحدة.
- رتبة البجعيات (بلشون، واق): سجل منها 6 انواع في العلا تعود لفصيلة واحدة.
- رتبة الزقزاقيات (دراج، قطقاط): سجل منها نوعان في العلا تعود لفصيلتين.
- رتبة البوميات (بومة): سجل منها 5 أنواع في العلا تعود لفصيلتين.
- رتبة الجوارح (مرزة، عقاب، حدأة، نسر) سجل منها 24 نوعا في العلا تعود لفصيلتين.
- رتبة قرنيات المنقار(هدهد): سجل منها نوع واحد في العلا.
- رتبة الشقراقيات (رفراف، شقرا، قارية): سجل منها 6 أنوع في العلا تعود لثلاث فصائل.
- رتبة نقاريات الشكل (قراع): سجل منها نوعان في العلا ينتميان لفصيلة واحدة.
- رتبة الصقريات (الصقور): سجل منها أربعة أنواع في العلا تعود لفصيلة واحدة.
- رتبة ببغائيات الشكل (درة): سجل منها نوعان في العلا تعود لفصيلة واحدة.
- رتبة الجواثم (العصفوريات): سجل 91 نوعا منها في العلا تعود لـ 23 فصيلة.

7. سمات الطيور

يمكن تحديد الطيور من خلال النظر في خصائصها الشكلية الخارجية، إلى جانب سلوكها وأماكن تواجدها.

بالنسبة للطيور الجاثمة، يمكن أن يساعد لون الريش في مناطق معينة من جسم الطائر (رقعة ما بين العين والمنقار، والجانبان) بالإضافة إلى شكل بعض الأجزاء الأساسية (المنقار، والذيل، وبروز الجناحين، والأرجل) في التمييز بين الأنواع المتقاربة والمتشابهة (**الشكل 6**).



الشكل 6 | منظر جانبي للعصفوريات يعرض المصطلحات المستخدمة لوصف الصفات الظاهرية للطيور المغردة.

بعض صفات الجناح مهمة في تعريف وتمييز أنواع الطيور المختلفة. الشكل العام للجناح والنمط ولون ريش الطيران ومكمن الجناح والطرف العلوي للجناح قبل بداية ريش الطيران وعند مفصل الرسغ تساعد في تمييز الأنواع المتقاربة (**الشكل 7**).



الشكل7 | المنظر العلوي للجناح مفتوحا مع المصطلحات المستخدمة لوصف الصفات الأساسية للجناح.

تتميز الطيور الجارحة بصفات فريدة تميزها عن بقية الأنواع، مما يتطلب ملاحظتها بدقة للتفريق بين الأنواع المتشابهة والمتقاربة داخل الجنس الواحد (**الشكل 8**). لا تقتصر أهمية التمييز على الألوان فقط، بل تشمل أيضًا تركيب الأجنحة وشكلها أثناء الطيران، وعدد الريش البارز للطيران، بالإضافة إلى لون الجناح عند مفصل الرسغ، وشكل الذيل وبنيته، وهي كلها صفات مميزة لأنواع الطيور الجارحة.



الشكل 8 | المصطلحات المستخدمة لوصف الطيور الكبيرة ومنها الطيور الجارحة.

8. قائمة الأنواع

النعام الشائع
Struthio camelus
Linnaeus, 1758

التوزيع العالمي: طائر مقيم، على امتداد دول كان النعام العربي (النويع *S. c. syriacus*) موجودا في الجزيرة العربية في الماضي ولكنه انقرض منذ منتصف القرن الماضي. والجدير بالذكر أن الجهود قائمة ومستمرة لإعادة هذا النوع في المنطقة.
التوزيع في العلا: منقرض إقليميا.

القياسات: طول الذكر: 210-275 سم وطول الأنثى: 175-190 سم؛ وزن الذكر: 100-156 كجم والأنثى: 90-110 كجم.
الصفات المميزة: طائر ضخم البنية غير قادر على الطيران، له رجلان ورقبه طويله. يكسو اللونان الأبيض والأسود ريش الذكور البالغة ولون الرقبة والأرجل أحمر. تظهر الإناث البالغة والأفراد اليافعة بلون عام بني باهت وعنق وأرجل باهتة اللون.
الموائل والمعيشة: توجد فُرادى أو في جماعات صغيرة في البيئات المفتوحة ذات الحشائش والأشجار الصغيرة مثل الصفائح الصخرية والحرات والسهول القاحلة. تتغذى على الحشائش والبذور وأوراق النباتات. كما تتغذى على الحشرات والفقاريات الصغيرة ايضاً. تضع أعشاشها على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: منقرض.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ويتم إعادة أكثرها إقليميا (RE).

حجل شائع
Alectoris chukar
(Gray, 1830)



التوزيع العالمي: يمتد توزيع هذا النوع من اليونان إلى الشمال الغربي للجزيرة العربية امتداداً إلى شرق الصين.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة عويرض ومحمية شرعان وجبل الورد.
القياسات: الطول: 34-38 سم والوزن: 550-675 جم.
الصفات المميزة: طائر متوسط الحجم ومكتنز الجسم، ذو لون رملي إلى رمادي باهت، ذو تاج (قلنسوة) رمادي اللون، ومنقار وحلقة ما حول العين حمراء، له نقوش شريطية سوداء واضحة ذات حدود علوية كريمية اللون تبدأ من مقدمة الرأس. وشرائط متقطعة جانبية.
الموائل والمعيشة: يتواجد في أزواج أو مجموعات صغيرة في الحرات والأودية الصغيرة وجوانب التلال وفي البيئات شبه الصحراوية. يتغذى في الأرض على البذور والحبوب والجذور والثمار وبادرات النباتات ويتغذى على الحشرات أيضاً. من الطيور المعششة على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

حجل عربي
Alectoris melanocephala
(Rüppell, 1835)



التوزيع العالمي: حجل مقيم وأصيل للجزيرة العربية، يوجد على امتداد سلسلة الجبال الغربية وفي اليمن وعمان.
التوزيع في العلا: يوجد الحجل العربي في وادي نخلة وكلٍ من جبل الورد وشيهوب وكذلك في حرة الزبن.
القياسات: الطول: 39-43 سم. وزن الذكر: 724 جم والأنثى: 522 جم.
الصفات المميزة: يشبه الحجل الشائع ولكنه أكبر قليلا بعنق وذيل أطول، يظهر الذيل بلون داكن من الأطراف في حالة الطيران، لديه تاج (قلنسوة) أسود وحاجب عريض أبيض والجزء الأمامي للعنق أبيض.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو مجموعات صغيرة على جوانب المرتفعات الصخرية المحتوية على الشجيرات، كما أنه يوجد في الجبال والأودية. يبحث عن المؤنة على الأرض، يقتات على البذور والحشائش وثمارها وكذلك على الحشرات. عادة ما يكون الحجل العربي نشطًا عند الغسق (قبل شروق الشمس) وهو من الطيور المعششة على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

حجل رملي
Ammoperdix heyi
(Temminck, 1825)



التوزيع العالمي: مقيم، يوجد في جنوب السودان وعبر الجزيرة العربية حتى جنوب سوريا.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العُلا باستثناء تيماء.
القياسات: الطول: 22-25 سم، الوزن: 180-200 جم.
الصفات المميزة: طائر صغير الحجم ممتلئ البنية ذو لون رملي عام وبني محمر على طرفي الذيل. للذكر رأس رمادي يميل للون الأزرق مع بقعة بيضاء على الخد تمتد لمقدمة الرأس (بين العينين للأسفل). ذو نقوش شريطية (خطوط) كثيفة على جانبي الجسم ومنقاره ذو لون برتقالي مصفر. تختلف ألوان الأنثى حيث أنها أدكن وتفتقر إلى اللون الأبيض على الخد كما في الذكور.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو مجموعات يصل عددها من بضعة أفراد لأكثر من ثلاثين فردا، توجد على جوانب الجبال والقمم الصخرية والأودية والجروف والحرات وكذلك البيئات شبه الصحراوية. يتكون غذاؤه من البذور والثمار الصغيرة والحشرات. يعشعش الحجل الرملي على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سماني شائعة
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر من غرب أوروبا إلى سيبيريا وجبال الهمالايا كما يوجد بشكل متفرق في الشمال الغربي وشرق وجنوب إفريقيا، يقضي الشتاء على الساحل الأفريقي وشرق إفريقيا وجنوب آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل وشرعان وكذلك في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 16-20 سم، الوزن: 70-155 جم.
الصفات المميزة: طائر صغير ممتلئ البنية ذو ذيل قصير وجناحين طويلين ويعتبر من طيور الطرائد (الصيد). ذو ريش بلون بني محمر مموه يساعده على التخفي عن المفترسات، الحاجبان مرقشان بلون رمادي وأسود وأصفر باهت، وشرائط من الخلف للأسفل وجوانب الجسم مخططة أيضا. الذكر ذو ألوان ونقوش داكنة على الصدر والرقبة وألوان الأنثى باهتة.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في مجموعات صغيرة في محاصيل الحبوب والحقول المروية بالري المحوري والسهول العشبية والمروج الصحراوية، يتغذى على الحبوب والبذور والحشائش والأعشاب وعلى الفقاريات الصغيرة أحياناً.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



يمامة برية
Columba livia
Gmelin, 1789



التوزيع العالمي: مقيم، ينتشر في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا. كما تم جلبه (مستأنس) في جميع أنحاء العالم.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا.
القياسات: الطول: 30-35 سم، الوزن: 180-355 جم.
الصفات المميزة: حمام كبير الحجم ذو لون رمادي فاتح، لون العجز أبيض ويظهر على الجناحين شرائط سوداء اللون. الرأس والعنق والذيل ذات ألوان داكنة مع لمعات بنفسجية وخضراء تنعكس من الريش المحيط بالعنق. الأفراد الهاربة من الأسر توجد بتباين متفاوت في ألوانها وأنماط نقوشها.
الموائل والمعيشة: يتواجد في جماعات على الجبال والمنحدرات والجروف وفي الأودية الصخرية كما أن وجوده يرتبط بوجود الإنسان والمزارع والتجمعات أو المجمعات السكانية. يتغذى على الحبوب والبذور والفواكه وفي بعض الأحيان على اللافقاريات وكذلك بقايا الطعام الناتجة عن الأنشطة البشرية. يبني أعشاشه على المنحدرات والجروف الصخرية والمباني.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

حمحم
Oena capensis
(Linnaeus, 1766)



التوزيع العالمي: مقيم، يوجد جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية ما عدا الغابات المطيرة كما ويوجد في الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا ما عدا محمية شرعان والغراميل.
القياسات: الطول: 22-26 سم، الوزن: 28-54 جم.
الصفات المميزة: حمام صغير الحجم، ونحيف البنية (أكبر من العصفور قليلاً)، ذو لون رمادي رملي، مع أجنحة محمرة ترى في وضع الطيران، يتميز هذا النوع بذيل طويل ذي ألوان داكنة. الذكر يتميز بوجود قناع (الجبهة والوجه) ومقدمة الصدر ذات لون أسود ومنقار أصفر. الأنثى سائدة اللون مع منقار داكن، كما أن للأفراد اليافعة أنماط نقوش متنوعة.
الموائل والمعيشة: في الغالب يوجد بشكل فردي أو في أزواج في البيئات شبه الصحراوية وفي الأودية والواحات والمزارع وبساتين النخيل وكذلك في المدن. ذو نمط تغذية أرضي ويقتات على البذور، يبني أعشاشه في الأدغال المكونة من الشجيرات الصغيرة.
الحالة: مقيم.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

فاختة النخيل
Spilopelia senegalensis
(Linnaeus, 1766)



التوزيع العالمي: مقيم، يمتد وجوده من أفريقيا حتى الهند وكازاخستان إلى الشرق الأوسط.
التوزيع في العلا: يوجد في جميع أنحاء العلا.
القياسات: الطول: 27 سم والوزن: 71-92 جم.
الصفات المميزة: يتميز هذا النوع بصغر حجمه ونحول جسمه، ذو أجنحة قصيرة وذيل طويل وأطراف بيضاء، يظهر ريش وسط الذيل باللون الرمادي. ذو لون ودري من الرأس إلى الصدر مع بقع نقطية سوداء على الرقبة، الظهر والجانب البطني ذات لون بني رملي يتبعه خط رمادي وأطراف الأجنحة داكنة. الأنثى باهتة اللون مقارنة بالذكر.
الموائل والمعيشة: توجد عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة في البيئات شبه الصحراوية والواحات والمزارع وبساتين النخيل والمدن والحدائق العامة. نمط التغذية على الأرض وتقتات على البذور والثمار وكذلك الحشرات من حين لآخر. تصنع أعشاشها على الأشجار والشجيرات وكذلك المباني.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليمياً (LC).

فاختة أوراسية
Streptopelia decaocto
Frivaldszky, 1838



التوزيع العالمي: مقيم، يمتد وجود هذا النوع من غرب أفريقيا وشمالها إلى شرق آسيا. تم إدخاله لأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا.
القياسات: الطول: 30-31 سم الوزن: 112-264 جم.
الصفات المميزة: يمام متوسط إلى كبير الحجم ذو لون باهت سائد، له جناحان وذيل طويلة. يتميز بوجود طوق غير مكتمل أسود، وحلقات عريضة بيضاء على الذيل. يصدر هذا النوع أصواتا ثلاثية المقطع هوو-هووووو-هوو تساعد على تميزها عن الفاختة الأفريقية.
الموائل والمعيشة: توجد عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة مرتبطة بوجود البشر في المزارع وداخل المدن والقرى والحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية، كما توجد أيضا في بعض الأودية المعزولة. تتغذى في الأرض على البذور والحبوب وعلى الأجزاء الخضرية للنبات وكذلك المخلفات العضوية أحياناً. تعشش على الأشجار والشجيرات وكذلك المباني.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

فاختة أفريقية
Streptopelia roseogrisea
(Sundevall, 1857)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، مقيم في دول الساحل الأفريقي، يوجد في جماعات مهاجرة حيث تتكاثر في شمال وجنوب نطاق إقامته الرئيسية في أفريقيا وحتى الجنوب الغربي للجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في جبل الورد.
القياسات: الطول: 26 سم، والوزن: 130-166 جم.
الصفات المميزة: مشابه لدرجة كبيرة للنوع الأوراسي لكنه أصغر حجما، ذو ألوان أبهت وذيل أقصر. لون البطن أكثر بيضاً وريش الطيران ومقدمة الذيل أغمق من النوع الأوراسي. يصدر تغريدات ثلاثية المقطع مميزة تساعد على تمييزه. الموائل والمعيشة: يتواجد في مجموعات صغيرة عادة في الغابات والأراضي الشجرية المفتوحة والبيئات شبه الصحراوية والمزارع والمدن. يتغذى على الأرض، يأكل البذور والثمار الصغيرة وكذلك أجزاء النباتات. تعشش على الأشجار والشجيرات.
الحالة: مهاجر متكاثر، زائر شتوي.
الوفرة: الجماعات المهاجرة المتكاثرة قليلة وكذلك أعداد الأفراد الزائرة في الشتاء.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قمري أوروبي
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر في أوروبا وشمال إفريقيا حتى كازاخستان وغرب الصين، يقضي الشتاء في دول الساحل الإفريقي.
التوزيع في العلا: يوجد في خيبر القديمة وواحات العلا.
القياسات: الطول: 27-29 سم، الوزن: 99-170 جم.
الصفات المميزة: طائر صغير ونحيل ذو رقعات على جانبي الرقبة مخططة باللون الأبيض والأسود وصدر وردي اللون، ذو رقط برتقالية وسوداء على أغطية الجناح. في وضع الطيران يظهر الذيل بلون داكن وله حلقات طرفية غليظة داكنة اللون. ألوان الأفراد اليافعة داكنة كما تفتقد إلى النقوش على العنق.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو مجموعات صغيرة في الغابات المفتوحة والواحات ومزارع النخيل والأراضي الزراعية. يتغذى على الأرض، يأكل البذور والثمار واللافقاريات، يعشش على الأشجار والشجيرات.
الحالة: يعتبر من الطيور المهاجرة المتكاثرة والمهاجرة العابرة أيضاً.
الوفرة: قليل، غير شائع.
حالة الحفظ: معرض للانقراض عالميا (VU) وغير مهدد إقليميا (LC).



كدرية حجازية
Pterocles lichtensteinii
Temminck, 1825



التوزيع العالمي: مقيم، من غرب الصحراء الكبرى الى شرق افريقيا ويمتد انتشاره إلى غرب وجنوب الجزيرة العربية، كما يتواجد في إيران وباكستان.
التوزيع في العلا: تم تسجيله في الغراميل وحرة الزبن وخيبر القديمة وجبل نهر وكذلك جبل الورد، يوجد أيضاً في حرة عويرض ووادي نخلة.

القياسات: الطول: 22-26 سم، وزن الذكر: 175-250 جم والأنثى: 190-230 جم.
الصفات المميزة: قطا صغير الحجم وقصير الذيل، يسود اللون الأصفر الباهت على ريشه مع خطوط مموجة كثيفة ذات لون أسود وأبيض. تتميز الذكور بحلقة عين صفراء ومنقار برتقالي اللون ونقوش شريطية النمط ذات لون أبيض وأسود على مقدمة الرأس (الجبهة). يمكن تمييز الأنثى عن الذكر بانعدام النقوش البارزة، كما أن لها حلقة عين باهتة اللون ومنقارا داكنا.
الموائل والمعيشة: طيور خجولة، غالباً ما تكون نشطة ليلاً. تتواجد في جماعات صغيرة عند أماكن تجمع المياه للشرب عند الغسق (مع شروق الشمس). تتواجد في الصحاري والوديان الصخرية والجبال الجرداء وذات النباتات المتفرقة. تتغذى بشكل أساسي على البذور وتقتات على الأجزاء الخضرية للنباتات والحشرات أحياناً. تعشش على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سبد أوروبي
Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر في غرب أوروبا إلى منغوليا كما يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وبشكل رئيسي في شرق وجنوب القارة الأفريقية.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 24-28 سم، الوزن: يزن الذكر: 51-101 جم وتزن الأنثى:67-95 جم.
الصفات المميزة: سبد ذو مظهر مموه يساعده على التخفي، له نقوش على هيئة خطوط مموجة ذات لون بني ورمادي وأبيض، الذيل طويل والأجنحة ذات أطراف مدببة. لديه نقوش بيضاء شريطية وبارزة على جناحيه عند مفصل الرسغ ووشاح الكتف. في وضع الطيران تظهر على الذكر بقع بيضاء واضحة على طرفي الجناحين وحواف الذيل.
الموائل والمعيشة: يتواجد بشكل فردي، في أماكن عديدة خلال هجرته، وبشكل عام في الأماكن المفتوحة ذات النباتات المتناثرة. طائر ليلي النشاط يتغذى على الحشرات الطائرة، يمكن رؤيته يصطاد الحشرات حول إضاءة الشوارع من حين لآخر.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميًا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

سبد مصري
Caprimulgus aegyptius
Lichtenstein, 1823



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر في شمال أفريقيا ودلتا نهر النيل وكذلك وسط آسيا؛ يقضي الشتاء بشكل رئيسي في دول الساحل الأفريقي.
التوزيع في العلا: يوجد السبد المصري في كل من الغراميل ومحمية شرعان وخيبر القديمة وحرة خيبر وكذلك في تيماء.
القياسات: الطول: 24-27 سم، الوزن: يزن الذكر: 68-93 جم وتزن الأنثى: 70 جم.
الصفات المميزة: ذو لون مموه وباهت يميل للون الرمادي والرملي، ذو ذيل قصير نسبيا، يمكن تمييزه بعدم وجود النقوش الشريطية على الجناح والنقوش البيضاء البارزة كما في النوع الأوروبي.
الموائل والمعيشة: يتواجد بشكل فردي أو جماعات صغيرة في موسم الهجرة حيث يظهر في أماكن متعددة. يفضل المعيشة في البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية وكذلك السهول الطينية والقاحلة التي يوجد بها نبات الطرفاء والأثل. ينشط ليلاً ويتغذى في حالة الطيران على الحشرات الطائرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليمياً (LC).

السبد النوبي
Caprimulgus nubicus
Lichtenstein, 1823



التوزيع العالمي: مقيم، ينتشر بعد التكاثر؛ يتواجد في شرق أفريقيا من السودان إلى تنزانيا، وشمال وغرب الجزيرة العربية وفلسطين والأردن.
التوزيع في العلا: يوجد في خيبر القديمة وحرة عويرض وحرة الزبن.

القياسات: الطول: 20-22 سم، وزن الذكر: 46-56 جم والأنثى: 49-69 جم.
الصفات المميزة: صغير الحجم ومكتنز (ممتلئ) البنية، يتميز بأن له ذيلا قصيرا وعريضا، وأجنحة أكثر استدارة مقارنة بالأنواع الأخرى. ذو ألوان مموهة تشابه السبد الأوروبي، ولكن يميزه وجود شريط بني محمر حول الرقبة، وكذلك نقوش شريطية على الجناح وعلى الجهة البطنية للجناح المتباينة مع أطراف الجناح الداكنة. الذكر ذو نقط بيضاء بارزة على أطراف الجناح وحدود الذيل.
الموائل والمعيشة: يوجد في أفراد أو في أزواج، خلال موسم التكاثر في البيئات الصحراوية الرملية والصخرية في بيئات الأشجار المتناثرة، يوجد أيضا في بساتين النخيل وكذلك في الأودية. طائر ليلي، يتغذى في حالة الطيران على الحشرات. يعشش على الأرض بين الأشجار والشجيرات.
الحالة: مقيم.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



سمامة ألبية
Tachymarptis melba
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: من الطيور المهاجرة جزئياً، يتكاثر في شرق وجنوب أفريقيا وحوض البحر المتوسط وجنوب آسيا وتركيا إلى الجزيرة العربية؛ يقضي الشتاء بشكل أساسي في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل.
القياسات: الطول: 20-22 سم، المسافة بين الجناحين: 54-60 سم، الوزن: 76-120 جم.
الصفات المميزة: سمامة كبيرة، متينة البنية ذات لون بني داكن. لديها أجنحة منجلية الشكل وذيل قصير ذو شعبتين على شكل سبعة يظهر البطن والصدر بلون أبيض.
الموائل والمعيشة: يوجد فُرادى أو في جماعات صغيرة، في أماكن متفرقة في موسم الهجرة، يوجد بشكل رئيسي في المناطق ذات الوفرة الغذائية (حشرات). يتغذي في وضع الطيران على الحشرات لارتفاعات تصل إلى 40 مترا. يقضي معظم حياته في الهواء ويهبط للتعشيش. نهاري المعيشة وقد ينشط ليلا في بعض الأحيان. يتكاثر في مستعمرات على الجروف وحواف الجبال.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سمامة شائعة
Apus apus
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: من الطيور المهاجرة، يتكاثر في كل من شمال وغرب أفريقيا ومن غرب أوروبا إلى سيبيريا ومنغوليا وشمال الصين. يقضي الشتاء في جنوب أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في محمية شرعان.
القياسات: الطول: 16-18 سم، المسافة بين الجناحين: 40-44 سم، الوزن: 31-52 جم.
الصفات المميزة: سمامة متوسطة الحجم، ذات ألوان سوداء، لها أجنحة مدببة تشبه المنجل وذيل ذو شعبتين يشبه رقم سبعة. رقعة الحلق صغيرة بلون باهت خفيفة التباين، كما يصدر نداءات وحيدة المقطع تساعد على التمييز بينه وبين السمامة الشاحبة.
الموائل والمعيشة: يوجد في موسم الهجرة في جماعات في أماكن متعددة وبشكل رئيسي في مناطق وفرة الغذاء (حشرات) مثل المزارع والواحات وأماكن تجمع المياه. يقضي حياته في الهواء يهبط فقط للتعشيش. يتغذى على الحشرات الطائرة.
الحالة: يعتبر من الطيور المهاجرة العابرة.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليمياً (LC).

سمامة فاتحة
Apus pallidus
(Shelley, 1870)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في دول البحر المتوسط وتشاد والنيجر والجزيرة العربية والخليج العربي. يقضي الشتاء بشكل رئيسي من غرب أفريقيا إلى السودان.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أرجاء العلا، ماعدا الغراميل وجبل نهر وخيبر القديمة وتيماء.
القياسات: الطول: 16-18 سم، المسافة بين الجناحين: 39-44 سم، الوزن: 42 جم.

الصفات المميزة: سمامة متوسطة الحجم ذات لون بني غامق، تشبه السمامة الشائعة لحد كبير وتتميز برقعة عنقية عريضة وجبهة بألوان باهتة. رقعة العين داكنة والريش الثانوي باهت اللون وذو نقوش حرشفية النمط. يصدر نداءات ثنائية المقطع تميزه عن الأنواع الأخرى المشابهة.
الموائل والمعيشة: يوجد في جماعات على الجروف والمنحدرات الصخرية والممرات الضيقة في الجبال وكذلك المناطق الوفيرة بالغذاء مثل المزارع والواحات ومناطق تجمع المياه. تتغذى وهي تطير على الحشرات. تتكاثر في مستعمرات وتعشش على المنحدرات والجروف الصخرية والكهوف والبنايات.
الحالة: مهاجر متكاثر وكذلك من الطيور المهاجرة العابرة.
الوفرة: الأفراد المهاجرة المتكاثرة غير شائعة، بينما المهاجرة العابرة شائعة.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليمياً (LC).

وقواق أرقط كبير
Clamator glandarius
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في جنوب أوروبا إلى العراق والصحراء الكبرى في أفريقيا، يقضي الشتاء في دول الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا.

التوزيع في العلا: حرة عويرض.
القياسات: الطول: 35-40 سم، الوزن: 118-168 جم
الصفات المميزة: وقواق كبير ذو ذيل طويل، الجزء العلوي ذو لون أبيض ونقاط داكنة، الجزء السفلي ذو لون كريمي باهت، والرأس والتاج رماديان فاتحان. الريش الأساسي للصغار ذات لون بني يميل للأحمر ولون التاج أسود.
الموائل والمعيشة: يعيش فرادى ويوجد في الغابات المفتوحة والمنحدرات الصخرية والمزارع والأدغال. يتغذى بين النباتات وعلى الأرض على الحشرات ومنها اليرقات بشكل كبير والسحالي أيضاً.
الحالة: عابر مهاجر.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

فرفر شائع
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)[1]

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في أوروبا ومعظم أفريقيا وآسيا، يُرى في هجرات جماعية، تقضي الجماعات المهاجرة الشتاء جنوبي نطاق إقامتها.
التوزيع في العلا: خيبر القديمة.
القياسات: الطول: 30-38 سم وزن الذكر:249-493 جم والأنثى: 192-343 جم.
الصفات المميزة: صغير الحجم وداكن اللون، طائر مائي يشبه البط، ذو شرائط جانبية واضحة باللون الأبيض، والجزء السفلي للذيل أبيض، الجبهة والتاج على شكل درع ذات لون أحمر يمتد لمنقاره الحاد ذي الطرف الأصفر. خارج الماء تظهر الأرجل طويلة بلون أخضر مصفر (زيتي) وأصابع طويلة. الصغار ذات لون داكن باهت ومنقار داكن.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو جماعات لأفراد من نفس الفصيلة في الأراضي المبللة والمستنقعات المُحاطة بالنباتات. آكل للنباتات والحيوانات. طائر قارت يتغذى على النبات والطحالب واللافقاريات المائية والأرضية والفقاريات الصغيرة. يعشش في الغطاء الخضري الكثيف على الأرض وأحيانا على ارتفاعات بسيطة فوق سطح الماء.
الحالة: مقيم، مهاجر عابر، وزائر شتوي.
الوفرة: الأفراد المقيمة والمهاجرة العابرة وكذلك الزائرة شتاء قليلة.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

لقلق أبيض غربي
Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)[2]

التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر في مناطق تمتد من غرب أوروبا وشمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى، يقضى الشتاء بشكل أساسي في الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي جنوب آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد هذا النوع في كلٍ من الغراميل وشرعان.
القياسات: الطول: 100-102 سم، المسافة بين الجناحين: 155-165 سم، الوزن: 2275-4400 جم.
الصفات المميزة: يميز هذا النوع بكبر حجمه مع أرجل طويلة ومنقار طويل ذات لون أحمر. يكسوه اللون الأبيض ما عدا ريش الطيران الأسود.
الموائل والمعيشة: يوجد على شكل أسراب في أماكن متعددة في موسم الهجرة، يفضل العيش في المناطق المفتوحة والأراضي الرطبة والمزارع، وكذلك مطارح النفايات. انتهازي يتغذى على اللافقاريات الكبيرة والفقاريات الصغيرة التي يمكنه اصطيادها. ويتغذى على الجيف والبقايا العضوية في مطارح النفايات.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميًا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

لقلق أسود
Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع مهاجرا جزئيا ويتكاثر على امتداد من غرب أوروبا إلى شرق آسيا. يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وفي الجنوب والجنوب الشرقي لقارة آسيا. كما يوجد في مجتمعات مقيمة في كلٍ من ايبيريا وجنوب أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة عويرض وجبل الورد وكذلك في حرة الزبن.
القياسات: الطول: 95-100 سم، المسافة بين الجناحين: 144-155 سم والوزن: 3000 جم.
الصفات المميزة: يشبه اللقلق الأبيض الغربي ولكنه يتميز بصغر حجمه ووجود ريش أسود لامع منتشر على جسمه. يكسوه ريش بطني وإبطي ذو لون أبيض. المنقار وحلقة العين والساقان لونها أحمر. الطور اليافع ذو ألوان باهتة وداكنة بمنقار وأرجل باهتة اللون أيضاً.
الموائل والمعيشة: طائر خجول الطباع يعيش مُرادى أو في مجموعات صغيرة خلال موسم هجرته، يوجد بشكل رئيسي في جداول وقنوات المياه والبرك وحقول الري والمستنقعات. يتغذى بشكل أساسي على الأسماك وبشكل ثانوي على اللافقاريات والبرمائيات والفقاريات الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميًا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميًا (NE).



بلشون أرمد
Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في مناطق تمتد من غرب أوروبا إلى شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية. يقضي الشتاء في حوض البحر المتوسط وأجزاء من الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا ومناطق إقامته في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
التوزيع في العلا: يوجد خارج المناطق المحمية، بين حرة الزبن وجبل نهر.
القياسات: الطول: 90-99 سم والوزن: 1020-2073 جم.
الصفات المميزة: طائر كبير قوي البنية ذو منقار سميك. العنق والرأس والجزء السفلي للجناح بيضاء اللون. شريط العين (الحاجب) ومنطقة (رقعه) الكتف وريش الطيران أسود. يميز هذا الطائر في وضع الطيران بملاحظة وجود بقعتين بيضاوين في مفصل الرسغ. للصغار ألوان باهتة قاتمة.
الموائل والمعيشة: يوجد على شكل أفراد منعزلة أو جماعات صغيرة في البيئات الرطبة مثل مجاري المياه والقنوات وبرك تخزين المياه، وفي حقول النباتات القصبية مثل نبات البردي. طيور انتهازية تتغذى على الأسماك والبرمائيات والفقاريات الصغيرة واللافقاريات المائية. قد ترى نشطة ليلا وعند ساعات الفجر والساعات الأولى من الليل.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميًا (LC) وقريب من التهديد إقليميًا (NT).

بلشون أرجواني
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر على امتداد متقطع من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا؛ يقضي الشتاء في مناطق إقامته جنوب الكرة الأرضية وعلى امتداد نهر النيل وفي الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في تيماء وخيبر القديمة.
القياسات: الطول: 78-90 سم وزن الذكر: 617-1218 جم والأنثى: 525-1135 جم.
الصفات المميزة: بلشون كبير وأنيق الشكل، ذو أرجل طويلة وعنق ومنقار رفيع مقارنة بجسمه، رأسه نحيل ذو ريش تاجي (قلنسوه) أسود وخطوط على الخد سوداء، أصغر قليلا من البلشون الرمادي وذو عنق أحمر مع نقوش شريطية سوداء وباطن الذيل أسود. الأجزاء العلوية رمادية زرقاء. لون الأفراد اليافعة بني محمر مع نقوش داكنة. لا يوجد لها لون أبيض على الأجنحة في حالة الطيران.
الموائل والمعيشة: طائر خجول يوجد بشكل فردي أو مجموعات صغيرة في البيئات الرطبة ذات الغطاء الخضري الكثيف مثل المستنقعات والمسطحات المائية ذات النباتات القصبية مثل البردي كما يوجد في مجاري المياه. يتغذى على الأسماك واللافقاريات المائية كما يتغذى على الثدييات الصغيرة والزواحف من حين لآخر. قد يكون نشطًا قبل شروق الشمس وبعد غروبها.
الحالة: مهاجر عابر وزائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

بلشون مذهب
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، مقيم في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتكاثر بشكل متقطع على امتداد حوض البحر المتوسط إلى آسيا الوسطى؛ يقضي الشتاء خلال مناطق إقامته وكذلك على امتداد نهر النيل.
التوزيع في العلا: يوجد في خيبر القديمة.
القياسات: الطول: 42-47 سم؛ الوزن: 230-370 جم.
الصفات المميزة: بلشون صغير الحجم مكتنز الجسم ومموه، لونه بني مصفر وله رقبة سميكة مخططة. في حالة الطيران يمكن رؤية الأجنحة والذيل بلون أبيض ناصع. للأفراد البالغة في موسم التكاثر ريش طويل يخرج من قفا الرقبة، ومنقار أزرق ذو طرف أسود.
الموائل والمعيشة: يعيش فرادى أو في مجموعات صغيرة، في مجاري المياه وقنوات الصرف والبرك. يتغذى بشكل أساسي على الحشرات المائية والأسماك والبرمائيات. قد يكون نشطا ليلا، وفي الساعات الأولى من الصباح والساعات الأخيرة من اليوم.
الحالة: مهاجر عابر وزائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

بلشون بقر غربي
Bubulcus ibis
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي (حيث تهاجر بعض المجتمعات وتبقى أخرى)، يتكاثر من باتاغونيا إلى شمال أمريكا الشمالية، وجنوب الصحراء الكبرى وكذلك في الشمال الغربي لإفريقيا، يتكاثر بشكل متقطع من غرب أوروبا إلى دول القوقاز. يقضي الشتاء في جنوبي مناطق إقامته.
التوزيع في العلا: يوجد خارج المناطق المحمية شمال خيبر القديمة.
القياسات: الطول: 46-56 سم الوزن: 270-512 جم.
الصفات المميزة: بلشون صغير ممتلئ الجسم أبيض، ذو عنق وأرجل قصيرة ومنقار أصفر قصير. في موسم التكاثر تظهر الأفراد بقلنسوة منفوشة ذات لون برتقالي ويتلون الصدر والظهر باللون البرتقالي أيضاً بينما يظهر المنقار بلون محمر. يميز الأفراد اليافعة منقار داكن اللون.
الموائل والمعيشة: يعيش في مجموعات صغيرة، يعتبر هذا النوع أقل اعتمادا على البيئات الرطبة كباقي أنواع البلشون، يوجد في المزارع التي تحتوي على الماشية والحقول المحروثة وحقول الري المحوري والمروج الخضراء كما يعثر على أفراد هذا النوع في مطارح النفايات. يتغذى بشكل أساسي على الحشرات والفقاريات الصغيرة، حيث يلتقط فرائسه من على الأرض وهو يمشي.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

غرنوق أبيض صغير
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في جنوب الصحراء العظمى وشمال غرب أفريقيا، ويتكاثر أيضاً في مناطق متفرقة من أوروبا وجنوب آسيا وجنوبها الشرقي وأستراليا. يقضي الشتاء في جنوبي مناطق إقامته.
التوزيع في العلا: يوجد في وادي نخلة.
القياسات: الطول: 55-65 سم الوزن: 280-710 جم.
الصفات المميزة: بلشون صغير الحجم وأنيق الشكل، أكبر من بلشون البقر الغربي، ذو عنق طويل ومنقار طويل ورفيع، وأرجل طويلة سوداء وأقدام صفراء.
الموائل والمعيشة: يوجد كأفراد أو مجموعات صغيرة في مجاري المياه وقنوات الصرف والبرك ومخازن المياه، والحقول المروية. انتهازي يتغذى على الأسماك والبرمائيات واللافقاريات الأرضية والمائية.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

بلشون ليل أرأس
Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر على امتداد الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وجنوب الصحراء العظمى في أفريقيا؛ يقضي الشتاء في مواطن إقامته في النصف الجنوبي من نطاق إقامته.
التوزيع في العلا: محمية شرعان.
القياسات: الطول: 58-66 سم، الوزن: 278-1100 جم.
الصفات المميزة: بلشون صغير ممتلئ البنية ذو عنق وأرجل وذيل ومنقار قصيرة، كما أن المنقار أسود ضخم. ذو قلنسوة وظهر سوداء اللون وعيون حمراء وأجنحة وذيل رمادي باهت، باطن الجناح أبيض. لون الصغار بني مخطط ولها عيون صفراء.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى وفي مجموعات صغيرة خلال الهجرة. نشط عند الفجر ويجثم مختفيًا بين الأشجار خلال اليوم في البيئات الرطبة. طيور انتهازية تتغذى على اللافقاريات الأرضية والمائية وكذلك الفقاريات الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر وزائر شتوي.
الوفرة: قليل، نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) غير مهدد إقليميا (LC).

قطقاط أشوك
Vanellus spinosus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر من غرب وشمال أفريقيا وعلى امتداد دول نهر النيل منتشر في أنحاء الشرق الأوسط. يقضي فصل الشتاء في المناطق الجنوبية لمواطن إقامته.

التوزيع في العلا: تيماء.
القياسات: الطول:25-28 سم الوزن: 127-177 جم.
الصفات المميزة: قطقاط ذو أرجل طويلة داكنة اللون، الجزء العلوي ذو لون بني رمادي باهت. لون الرأس والجزء البطني أسود، الخدان وجانبا العنق أبيضان. في وضع الطيران يظهر الجناح بألوان ثلاثية النمط؛ ريش الطيران أسود اللون، ورمادي - بني باهت عند مفصل الرسغ مع نقوش شريطية بيضاء بينها. الذيل أبيض مع شريط عريض في الطرف أسود اللون.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو جماعات صغيرة، في البحيرات المؤقتة وبرك المياه، وبرك مياه الصرف، والحقول المروية. يتغذى على الحشرات واليرقات. يعشش على الأرض، يحدث ضوضاء وأصواتًا صاخبة في موسم التكاثر.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قطقاط أشوك
Vanellus spinosus

دراج شائع
Cursorius cursor
(Latham, 1787)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر من شمال أفريقيا مرورا بالشرق الأوسط إلى باكستان. يقضى الشتاء بشكل أساسي في دول الساحل الأفريقي وباكستان وفي الشمال الغربي للهند.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل ووادي نخلة وشرعان.

القياسات: الطول: 19-24 سم والوزن: 102-119 جم.
الصفات المميزة: متوسط الحجم ذو قلنسوة زرقاء رمادية وشريطين ذوي ألوان بيضاء وسوداء تبدأ من العين وتلتقي في قفا الرأس مكونةً شكل 'V' (رقم سبعة). في وضع الطيران، تظهر الجهة السفلية والعلوية للجناحين باللون الأسود بدايةً من مفصل الرسغ إلى الأطراف. ألوان الصغار قاتمة وباهتة خفيفة النقوش.
الموائل والمعيشة: يوجد فُرادى أو في أزواج أو مجموعات صغيرة بعد موسم التكاثر، يوجد في البيئات الرملية والحصوية وكذلك الصخرية والبيئات شبه الصحراوية والسهول الخضراء ذات الأعشاب والحشائش القصيرة. يتغذى بشكل رئيسي على يرقات الحشرات واللافقاريات الأخرى، والبذور، كما يأكل السحالي في بعض الأحيان. يعشعش القطا العسلي علي الارض.
الحالة: مقيم،
الوفرة: غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

دراج شائع
Cursorius cursor

صدى
Athene noctua
(Scopoli, 1769)



التوزيع العالمي: طائر مقيم، ينتشر من غرب أوروبا إلى الصين وشمال أفريقيا وشمالي شرقها وفي الشرق الأوسط.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا باستثناء حرة الزبن وجبل نهر وخيبر القديمة وتيماء
القياسات: الطول: 21-23 سم، المسافة بين الجناحين: 54-58 سم، الوزن: 162-206 جم.
الصفات المميزة: بومة صغيرة ذات جسم ممتلئ (مكتنز) ذات رأس كبير ومستدير، الوجه غير مميز، ذات عيون صفراء كبيرة وأرجل طويلة. يتدرج الريش في الألوان من البني الداكن إلى الرمادي الباهت في تحت النوع "صدى صحراوي" (*A. n. lilith*). الجزء العلوي ذو نقط بيضاء والجزء السفلي ذو نقوش خطية بنية. تتميز بشكل رأسها من الخلف الذي يشبه الوجه. لها صوت شائع حيث تصدر نداءات ناعمة وشجية "كووووه"، أو نداءات قصيرة حادة الصوت يشبه نطق "ويبو".
الموائل والمعيشة: يوجد وحيدًا أو في جماعات صغيرة في المنحدرات الصخرية والأودية وحقول الحمم البركانية والحرات وكذلك الأراضي شبه الصحراوية والبروزات الصخرية والمزارع. ذو نمط معيشة ليلي وقد ينشط نهارا في فترات قصيرة، ينشط بشكل رئيسي عند الغسق والشفق (مع الشروق وعند الغروب). يتغذى على الحشرات الكبيرة والقوارض والطيور الصغيرة والسحالي. يعشش في الفجوات الصخرية والشجرية وكذلك في فجوات المباني.
الحالة: مقيم.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

ثبج فاتح
Otus brucei
(Hume, 1873)

التوزيع العالمي: من الطيور المهاجرة جزئياً، تتكاثر بشكل متفرق في بلاد الشام والعراق وشرق عمان والإمارات العربية المتحدة ومن إيران لكازاخستان حتى باكستان. يقضي الشتاء في جنوب آسيا وتوجد بأعداد قليلة في فلسطين والجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: توجد في حرة الزبن.
القياسات: الطول: 18-21 سم، المسافة بين الجناحين: 54-64 سم، الوزن: 100-110 جم.
الصفات المميزة: بومة صغيرة ذات لون رمادي باهت وعيون صفراء، خصل الريش الأذنية سميكة ولكن غير دائمة حيث تختفي في حال الراحة (السكون) قريبة الشبه ببومة الأشجار الأوراسية (ليست موضحة في هذا الدليل) ولكن يمكن تمييزها بأن الذيل يمتد إلى ما بعد طرفي الجناحين، ووشاح الكتف (قوس الجناح الأمامي) منفوش الريش لحد ما (غير بيضاء). الجزء البطني مخطط بلون داكن يفتقد النقوش الموجية البيضاء المتداخلة.
الموائل والمعيشة: فرادى، مموهة ومتخفية، توجد على الأشجار الكبيرة في الأودية والسهول الصخرية والتلال والبيئات شبه الصحراوية وبساتين النخيل والمنتزهات. كائن ليلي المعيشة يفترس الحشرات الكبيرة والثدييات الصغيرة والطيور والسحالي.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

بومة الصحراء
Strix hadorami Kirwan, Schweizer & Copete, 2015



التوزيع العالمي: يعتبر من الأنواع المقيمة، ينتشر في أنحاء الجزيرة العربية ويرتبط وجوده بالسلاسل الجبلية الرئيسية، يوجد أيضا في جنوب دول الشام وفي سيناء وشرقي مصر.
التوزيع في العلا: ينتشر هذا النوع في أغلب أنحاء العلا باستثناء الغراميل وحرة خيبر وخيبر القديمة وتيماء.
القياسات: الطول: 30-35 سم، المسافة بين الجناحين (باع الجناحين): 95-98 سم، الوزن: 140-284 جم.
الصفات المميزة: بومة متوسطة الحجم ألوانها تميل للون الرملي، ذات رأس مستدير كبير وعينين برتقاليتين. الوجه والجسم من ناحية البطن بيضاء ولها نقوش شريطية بلون رصاصي فاتح. الجناح والذيل ذات نقوش شريطية داكنة. تصدر نداءات خماسية المقطع تشابه نطق 'هو هو-هو هو-هو'.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في أزواج في الجبال الصخرية والصحاري المحتوية على منحدرات الصخور الرملية، توجد أيضًا على حواف المنحدرات والشعاب (الممرات الضيقة بين الأودية والجبال أو الأخاديد). تنشط ليلاً وتتغذي على القوارض والوزغ والطيور الصغيرة والحشرات. تعشش على حواف المنحدرات.
الحالة: مقيم.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

بوهة صحراوية
Bubo ascalaphus
Savigny, 1809

التوزيع العالمي: نوع مقيم، ينتشر من شمال غربي أفريقيا وبشكل متفرق في الصحراء الكبرى، والساحل الأفريقي والشرق الأوسط.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل ومحمية شرعان ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 45-50 سم، المسافة بين الجناحين: 100-120 سم، وزن الذكر: 1900 جم، الأنثى: 2300 جم.
الصفات المميزة: بومة متوسطة إلى كبيرة الحجم يغلب عليها اللون الرملي الباهت وخصلة الأذن دائمة، ذات عيون كبيرة برتقالية اللون. قرص الوجه محاط بإطار داكن والحلق أبيض اللون والصدر به خطوط داكنة إلى حد كبير والأجزاء العلوية بها بقع داكنة. يصدر نداءات وحيدة المقطع 'هيو' بصوت عميق (غليض).
الموائل والمعيشة: يعيش منعزلا في أفراد، يوجد في المناطق الرملية ذات التكوينات الحجرية الرملية، والجروف والمنحدرات والخنادق والجبال الصخرية. طائر ليلي يتغذى بشكل رئيسي على القوارض، تفترس الثدييات متوسطة الحجم والطيور والزواحف واللافقاريات الكبيرة. يعشش على الجروف والمنحدرات الصخرية.
الحالة: مقيم.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

صدى
Athene noctua

ثيج فاتح
Otus brucei

بومة الصحراء
Strix hadorami

بوهة صحراوية
Bubo ascalaphus

هامة

Tyto alba

(Scopoli, 1769)



التوزيع العالمي: طائر مقيم في كل أنحاء العالم تقريباً، يوجد في الأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوبي شرق آسيا وأستراليا.

التوزيع في العلا: يوجد في خيبر القديمة وحرة عويرض وواحة العلا.

القياسات: الطول: 29-44 سم، المسافة بين الجناحين: 80-95 سم، الوزن: 187-455 جم.

الصفات المميزة: بومة متوسطة الحجم وجهها قلبي الشكل (يشبه شكل القلب)، العيون، سوداء، تحت النوع الموجود في المنطقة (*T. a. erlangeri*) بومة المخازن العربية، تتميز بوجه وبطن أبيض ذي نقوش خفيفة في بعض الأفراد، الظهر ذو لون أرجواني باهت يميل للرمادي. يصدر أصوات هسهسه وصراخ.

الموائل والمعيشة: يتواجد على شكل أفراد أو أزواج في بساتين النخيل والمزارع والأراضي شبه الصحراوية وغالبا ما يرتبط وجوده بوجود البشر. طائر ليلي يتغذى بشكل أساسي على القوارض والخفافيش والطيور الصغيرة والحشرات الكبيرة. يعشش في الفجوات بين الصخور وفي الأشجار وكذلك المباني.

الحالة: مقيم.

الوفرة: قليل.

حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

هامة
Tyto alba

زرق شائع
Elanus caeruleus
(Desfontaines, 1789)[1]



التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المقيمة، يوجد في جنوب غربي أوروبا والدول الواقعة شمال الجزء الجنوبي للصحراء الكبرى في أفريقيا ويوجد في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. ينتشر بوفرة بعد موسم التكاثر.
التوزيع في العلا: يوجد في محمية شرعان.
القياسات: الطول: 30-37 سم، وزن الذكر: 197-277 جم والأنثى: 219-343 جم.
الصفات المميزة: من الطيور الجارحة الصغيرة تشبه حجم الصقر، الأجنحة عريضة ومدببة الطرف، الذيل قصير والرأس كبير والعيون حمراء اللون. لون الجزء العلوي رمادي باهت ووشاح الكتف أسود. يظهر الجزء السفلي بلون أبيض وطرفا الجناح أسودان. الصغار ذات لون بني محمر للجزء السفلي وريش الجناح الطرفي أبيض من الجهة العليا.
الموائل والمعيشة: يتواجد على شكل أفراد أو أزواج في المناطق المفتوحة ذات الأشجار المتناثرة. يتواجد أيضا في البيئات شبه الصحراوية والمزارع والحقول المزروعة. يتغذى بشكل رئيسي على الجرذان حيث يرصدها وهو جاثم على الأشجار وكذلك أو أثناء تحليقه فوق الحقول، يتغذى أيضا على الثدييات الصغيرة والطيور والسحالي والحشرات.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ومعرض للانقراض إقليميا (VU).

عقيب العسل أوربية
Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)[2]



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، يتكاثر على امتداد من غرب أوروبا إلى إيران وسيبيريا. يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.
التوزيع في العلا: يتواجد في تيماء وواحات العلا.
القياسات: الطول: 52-60 سم، المسافة بين الجناحين: 118-150 سم، الوزن: 360-1050 جم.
الصفات المميزة: طائر جارح متوسط الحجم ذو رأس صغير بارز. الذيل طويل نسبيا وله ثلاث حلقات، حلقة على طرف الذيل واثنتان عند قاعدة الذيل (منبت الذيل). الجناح عريض ومنحني ذو نقوش قليلة وله خمس من الريش الطرفي تشبه الأصابع. الريش متغاير الألوان من بني وأحمر إلى ألوان باهتة وبقعة داكنة اللون عند مفصل الرسغ. الرأس رمادي اللون عند الذكور وبني للأنثى والصغار. الموائل والمعيشة: يهاجر في أسراب يمكن رؤيتها في أمكان متعددة. يتغذى بشكل رئيسي على الدبابير والزنابير حيث تلتقطها من أعشاشها ويتغذى على الحشرات الكبيرة الأخرى والثدييات الصغيرة والسحالي والطيور.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

عقيب العسل شرقية
Pernis ptilorhynchus
(Temminck, 1821)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا ومن الشرق الأقصى لروسيا حتى اليابان. يقضي الشتاء في جنوبي نطاق تكاثره وفي الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في تيماء.
القياسات: الطول: 52-68 سم، المسافة بين الجناحين: 115-155, وزن الذكر: 750-1280 جم والأنثى: 950-1490 جم.
الصفات المميزة: يشبه حوام العسل الأوروبي ولكنه أكبر قليلا، والجناح أعرض وذو ست ريشات طرفية أصبعية الشكل والذيل أقصر. يفتقد البقع الداكنة عند مفصل الرسغ. للأفراد البالغة طوق عنقي (يشبه الدرع) بارز ولون رأس الذكور رمادي والعيون داكنة ولها حلقتان عريضتان على الذيل. الرأس بني عند الأنثى والعيون صفراء اللون وللصغار رأس بني وعيون داكنة والجزء السفلي للظهر قبل الذيل (وشاح العجز) شاحب اللون.
الموائل والمعيشة: يوجد في أفراد منعزلة أو في مجموعات صغيرة في الأدغال الشجرية المفتوحة والحقول الزراعية المروية والواحات. يتغذى على مستعمرات النحل والدبابير وعلى شمع العسل والعسل والحشرات الأخرى الكبيرة والثدييات الصغيرة والطيور.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: نادر، نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

رخمة
Neophron percnopterus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، حيث تهاجر جماعات عن أخرى، يتكاثر في حوض البحر المتوسط والصحراء الكبرى والساحل الأفريقي وجنوب آسيا. يقضي الشتاء بشكل رئيسي في جنوبي نطاق إقامته.
التوزيع في العلا: محمية شرعان وحرة خيبر.

القياسات: الطول: 54-70 سم، المسافة بين الجناحين: 146-175 سم، الوزن: 1600-2400 جم.
الصفات المميزة: يتميز هذا النسر بصغر حجمه مقارنة بأنواع النسور الأخرى كما أنه ذو ألوان سوداء وبيضاء، يخلو الوجه من الريش (عاري الوجه) ومنقاره رفيع، الجناحان مستقيمان وكبيران والذيل ذو شكل وتدي (مثلث الشكل مدبب الطرف). الصغار ذات لون عام داكن والوجه والأرجل بلون رمادي شاحب.
الموائل والمعيشة: يوجد إما بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة في المواقع الغنية بالغذاء. يوجد في المناطق المفتوحة والأراضي القاحلة والجبال والوديان ومطارح النفايات. يتغذى بشكل أساسي على بقايا الجثث التي تخلفها النسور الأخرى، ويأكل الحشرات الكبيرة وبيض الطيور والمخلفات الغذائية للبشر. يعشش على الحواف والجروف الصخرية.
الحالة: مقيم، مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: نادر، قليل، نادر.
حالة الحفظ: مهدد بالانقراض عالميا (EN) ومعرض للانقراض إقليميا (VU).

يافع

بالغ

نسر أوراسي
Gyps fulvus
(Hablizl, 1783)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع مهاجرًا جزئيًا، يتكاثر على امتداد من حوض البحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وبعض المناطق في آسيا الوسطى. تقضي الأفراد اليافعة الشتاء في دول الساحل الأفريقي والشمال الشرقي والغربي لأفريقيا ومن جنوب أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوبها.
التوزيع في العلا: تم تسجيله في حرة عويرض وحرة خيبر ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 106-120 سم، المسافة بين الجناحين: 233-276 سم، الوزن 6000-11000 جم.
الصفات المميزة: نسر ضخم البنية، بني اللون، الجناحان طويلان وعريضان ومقوسان، الذيل قصير وداكن. الرأس والعنق باهتا اللون وريش الطيران داكن ولون الجسم بني باهت. تظهر الصغار بلون أدكن وطوق الريش على قاعدة العنق بني والمنقار رمادي، طوق ريش الأفراد البالغة ذو لون أبيض والمنقار أصفر، تحلق عاليا في السماء وترفع أجنحتها لتكون شكل الرقم سبعة بزاوية مفتوحة قليلا.
الموائل والمعيشة: يوجد في أسراب في الجبال والحرات وأماكن متفرقة أخرى بحثا عن الغذاء. يقتات على جيف الحيوانات النافقة والبقايا من مخلفات البشر. يعشش على المنحدرات الغذاء.
الحالة: مقيم، مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: نادر، غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ومهدد بالانقراض إقليميا (EN).

نسر مسود
Aegypius monachus
(Linnaeus, 1766)

التوزيع العالمي: نسر مهاجر جزئي، يتكاثر في ايبيريا وتركيا إلى منغوليا والصين. يقضي الصغار الشتاء غرب الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والهملايا وشبه الجزيرة الكورية.
التوزيع في العلا: حرة عويرض وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 102-112 سم، المسافة بين الجناحين: 250-295 سم، الوزن 7000-12500 جم.
الصفات المميزة: نسر ضخم داكن ذو أرجل شاحبة اللون وأجنحة مستقيمة وعريضة طويلة وذيل قصير. الجزء السفلي للجناح أدكن لونا من الجزء العلوي ومن ريش الطيران. يظهر الصغار بلون أغمق ورؤوسها سوداء، ويظهر للأفراد البالغة تاج أبيض اللون. كما النسر الاذون (النوبي)، يحلق بجناحيه الخارجيين المنخفضين.
الموائل والمعيشة: يعيش بشكل فردي أو أسراب مندمجة مع الطيور الجارحة الأخرى المهاجرة، يعيش في الجبال النائية (المقفرة) والحرات والسهول والمناطق شبه الصحراوية.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: قريبا من تهديد الانقراض عالميًا (NT) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

نسر آذن
Torgos tracheliotos
(Forster, 1791)

التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المقيمة، يوجد في الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل.

القياسات: الطول: 115 سم، المسافة بين الجناحين 280 سم، الوزن: 9400-5400 جم.
الصفات المميزة: نسر ضخم ولون الريش بنى داكن والأجنحة طويلة وعريضة ذات شكل مقوس قليلا والذيل قصير. لون الرأس شاحب وعاري من الريش، طوق الريش حول العنق داكن، الصدر ذو خطوط بنية وبيضاء موجية النمط. يغطي أرجله الريش فاتح اللون، توجد خطوط رفيعة ذات لون شاحب على الجهة البطنية للجناح. يظهر الصغار بألوان أغمق.
الموائل والمعيشة: يوجد غالبا في أزواج في المناطق المفتوحة والصحاري متناثرة الأشجار. يتغذى على جيف الحيوانات النافقة، عدائية وتظهر سيطرتها على الطيور القمامة الأخرى فيما يتعلق بالأكل. تبني أعشاشا ضخمة على قمم الأشجار الصحراوية مثل أشجار الأكاسيا (اشجار السنط).
الحالة: مقيم.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: مهدد بالانقراض عالميا (EN) ومعرض للانقراض إقليميا (VU).



عقاب رقطاء كبرى
Clanga clanga
(Pallas, 1811)

التوزيع العالمي: عقاب مهاجر، يتكاثر من شرق أوروبا إلى شرق آسيا، يقضي الشتاء في جنوب أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأجزاء من الجنوب الشرقي لآسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل.
القياسات: الطول: 59-71 سم، المسافة بين الجناحين: 155-180 سم، الوزن: يزن الذكور بين 1500 إلى 1900 جرام بينما تزن الأنثى حوالي 1800-2500 جرام.
الصفات المميزة: عقاب متوسط إلى كبير الحجم ذو لون داكن وأجنحة طويلة مستطيلة الشكل، والذيل قصير. لها نقش يشبه شكل الفاصلة بلون أبيض عند مفصل الرسغ على الجزء السفلي للجناح، لون الريش المغطي للجناح أغمق من ريش الطيران، الصغار لها نقاط بيضاء تتوزع على الجزء العلوي، يغطي أرجلها ريش ذو ألوان باهته.
الموائل والمعيشة: يعيش على شكل أفراد او مجموعات صغيرة في الشتاء، يوجد قريبا من الأراضي الرطبة ومناطق النشاط البشري مثل حقول زراعة المحاصيل، والبرك ومناطق تجمع المياه والمستنقعات ومطارح النفايات. طيور انتهازية تتغذي على الثدييات الصغيرة والطيور متوسطة الحجم وجيف الحيوانات النافقة والسحالي والحشرات الكبيرة.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: نادر، نادر.
حالة الحفظ: معرض للانقراض عالميا (VU) مهدد بالانقراض إقليميا (EN).

عقاب سهبية
Aquila nipalensis
Hodgson, 1833



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر من الأناضول وبحر قزوين إلى شمال شرق الصين. يقضي الشتاء في جنوب وشرق أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل وحرة الزبن وحرة عويرض ومحمية شرعان ووادي نخلة وجبل نهر وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 60-81 سم، المسافة بين الجناحين: 165-214 سم، الوزن: يزن الذكر: 2000-3500 جم والأنثى: 2300-4900 جم.
الصفات المميزة: عقاب كبير الحجم ذو أجنحة عريضة. لون الأفراد البالغة بني داكن وقفا الرأس يميل للون الأصفر، وبقع داكنة على الجناح (الرسغ) ريش الطيران مخطط ذو حواف بيضاء. وخط أصفر طويل يمتد على طول جانبي المنقار إلى خلف العين.
الموائل والمعيشة: توجد في جماعات في موسم الهجرة، وتظهر في مناطق متفرقة، من ضمنها مرمى النفايات والمناطق السكنية. يفترس بشكل رئيسي الثدييات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويتغذى أيضا على جيف الحيوانات النافقة وبقايا الطعام.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، نادر.
حالة الحفظ: مهدد بالانقراض عالميا (EN) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

عقاب ملكية شرقية
Aquila heliaca
Savigny, 1809



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في شرق أوروبا امتدادا إلى شمال شرق آسيا، يقضي الشتاء في شرق أفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا. التوزيع في العلا: محمية شرعان.
القياسات: الطول: 72-84 سم، المسافة بين الجناحين: 180-215 سم، وزن الذكر: 2450-2720 جم والأنثى: 3160-4530 جم.
الصفات المميزة: عقاب كبير الحجم ذو ذيل قصير نسبياً وأجنحة شبه مستطيلة. الذكر داكن وقفا الرأس ذهبي باهت ونقوش الكتف بيضاء وله نقش حلقي على نهاية الذيل. الصغار ذات خطوط داكنة ولون رملي إلي بني باهت كما تصبح أدكن مع تقدمها في العمر.
الموائل والمعيشة: منعزلة في أفراد أو في جماعات صغيرة، توجد في البيئات شبه الصحراوية المشجرة والسهول ومطارح النفايات. تفترس الثدييات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل رئيسي وتتغذى أيضا على الطيور والسحالي والجيف.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: معرض للانقراض عالميا (VU) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

عقاب مذهبة
Aquila chrysaetos
Gray, 1860

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يوجد في إقليم أوراسيا (Palearctic) والجزيرة العربية وأمريكا الشمالية.
التوزيع في العلا: حرة خيبر.
القياسات: الطول: 70-99 سم، المسافة بين الجناحين: 185-222 سم، وزن الذكر: 2387-4500 جم والأنثى: 3048-6460 جم.
الصفات المميزة: عقاب كبير بلون بني داكن وقفا الرأس ذهبي والجزء العلوي للجناح ذهبي اللون، الذيل طويل والأجنحة مستديرة. يكون الذيل بلون أبيض في الصغار وحلقة الذيل الطرفية داكنة وخطوط الجناح بيضاء. تشبه الأجنحة شكل رقم سبعة بزاوية مفتوحة في وضع الطيران.
الموائل والمعيشة: فرادى أو في أزواج، يوجد في المناطق الجبلية وشبه الصحراوية المشجرة. يتغذى بشكل رئيسي على الثدييات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك على الطيور والسحالي والجيف. تعشش على حواف الجبال ونادرا على الأشجار.
الحالة: مقيم،
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ومهدد بالانقراض إقليميا (EN).

عقاب خدارية
Aquila verreauxii
Lesson, 1830

التوزيع العالمي: مقيم، يوجد من شرق أوروبا إلى جنوب أفريقيا مع مجتمعات معزولة في التشاد والنيجر ومصر والجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: جبل الورد.
القياسات: الطول: 80-90 سم، المسافة بين الجناحين: 181-219 سم، وزن الذكر: 3000-4150 جم، والأنثى: 3100-5800 جم.
الصفات المميزة: عقاب أسود كبير ملفت للنظر، الجناح والذيل طويلة ذات شكل مجداف تكون أكثر وضوحا في الأنثى، وشاح العجز (الجزء الأخير للظهر قبل الذيل) بشكل سبعة على الظهر ناصع البياض. في الصغار لون الظهر يميل للبني مع نقوش على هيئة خطوط للجزء البطني.
الموائل والمعيشة: يعيش بشكل فردي أو في أزواج في الجبال الصخرية حيث يعشش على المنحدرات والممرات الضيقة في الجبال. يعتمد غذاؤه بشكل كبير على الوبر الصخري حيث ينقض عليها بشكل مفاجئ، يصطاد بشكل فردي أو بشكل تعاوني في أزواج. ويصطاد الثدييات متوسطة الحجم الأخرى والطيور والسحالي.
الحالة: مقيم.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ومهدد بالانقراض إقليميا (EN).

عقاب بونلية
Aquila fasciata
(Vieillot, 1822)



التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المقيمة، يوجد من إيبريا وشمال غرب أفريقيا حتى حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى جنوبي شرقها.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة الزين وجبل الورد وحرة عويرض ووادي نخلة وجبل نهر.
القياسات: الطول: 55-67 سم، المسافة بين الجناحين: 143-176 سم، وزن الذكر: 1400-2240 جم والأنثى: 2100-3025 جم.
الصفات المميزة: متوسط إلى كبير الحجم قوي البنية ذيله طويل ويحتوي على حلقات عريضة. الجزء السفلي أبيض مموج يتباين مع الأجنحة داكنة اللون. وشاح الظهر أبيض متباين على الجزء العلوي البني الداكن. الصغار ذات لون يميل للاحمرار للجزء السفلي وتفتقر إلى حلقات الذيل الطرفية.
الموائل والمعيشة: يتواجد على شكل أفراد أو أزواج في الجبال وجوانب الجبال المشجرة. يتغذى بشكل رئيسي على الطيور المتوسطة الحجم والثدييات ويقتات في بعض الأحيان على السحالي الكبيرة. يعشش على المنحدرات والجروف.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

صرارة
Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر من جنوبي غرب أوروبا وشمالي غرب أفريقيا إلى منغوليا وجنوب آسيا وأجزاء من الجزيرة العربية، يقضي الشتاء في الساحل الأفريقي.
التوزيع في العلا: سُجل في حرة عويرض وجبل شيهوب والغراميل ومحمية شرعان.
القياسات: الطول: 62-70 سم، المسافة بين الجناحين: 166-188 سم، وزن الذكر: 1200-2000 جم والأنثى: 1300-2300 جم.
الصفات المميزة: عقاب كبير الحجم ذو رأس كبير وألوان باهتة، لون العيون برتقالي، عريض وطويل الجناحين. الرأس ورقعة الحلق بنية، الجزء البطني مع الذيل أبيض ذو خطوط عرضية موجية النمط بلون بني. الصغار باهتة شاحبة اللون ورقعة الحلق باهتة.
الموائل والمعيشة: توجد منعزلة بشكل فردي في المناطق الشجرية المفتوحة شبه الصحراوية والحرات والسفوح الصخرية. ذات نمط تغذية يعتمد على الزواحف وتكشف مواقع فرائسها وهي جاثمة على ارتفاعات كبيرة أو وهي تحلق فوقها وتفترس الثعابين بشكل كبير. تعشش على الجروف الصخرية أو الأشجار.
الحالة: مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: نادر، قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميًا (LC) ومعرض للانقراض إقليميا (VU).

عقاب مسيرة
Hieraaetus pennatus
(Gmelin, 1788)



التوزيع العالمي: عقاب مهاجر، يتكاثر من جنوب أوروبا وشمالي غرب أفريقيا إلى آسيا ومنغوليا، يقضي الشتاء جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في كلٍ من تيماء وحرة عويرض.
القياسات: الطول: 42-51 سم، المسافة بين الجناحين: 113-138 سم، وزن الذكر: 510-770 جم والأنثى: 840-1250 جم.
الصفات المميزة: عقاب صغير الحجم وذيله مربع الشكل، الأجنحة طويلة ذات ريش طرفي دائم يشبه الأصابع، الجزء العلوي للجناح وطرف الظهر دون الذيل باهت اللون. لهذا العقاب نمطان من الألوان: إما شاحب، مع أجزاء سفلية بيضاء وريش طيران أسود؛ أو داكنة، تتراوح من البني الداكن إلى الأجزاء السفلية المحمرة مع نوافذ (رقع فاتحة اللون على الجزء الداخلي للجناح) شاحبة.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في مجموعات صغيرة تحلق في بيئات مختلفة خلال موسم الهجرة وتفضل المناطق ذات الغطاء الشجري. تتغذى بشكل رئيسي على الطيور الصغيرة والمتوسطة الحجم والثدييات الصغيرة وعلى السحالي في بعض الأحيان.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

عقاب رقطاء كبرى
Clanga clanga

يافع بالغ

عقاب سهبية
Aquila nipalensis

يافع بالغ

عقاب ملكية شرقية
Aquila heliaca

يافع بالغ

عقاب مذهبية
Aquila chrysaetos

يافع

بالغ

عقاب خدارية
Aquila verreauxii

يافع

بالغ

عقاب بونلية
Aquila fasciata

بالغ

صرارة
Circaetus gallicus

عقاب مسيرة
Hieraaetus pennatus

داكن

فاتح

مرزة مستنقعية
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، مواطن تكاثرها تمتد من غرب أوروبا إلى منغوليا ويقضي الشتاء في جنوب أوروبا وعلى امتداد نهر النيل وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب قارة آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل وحرة خيبر ووادي نخلة ومحمية شرعان.
القياسات: الطول: 43-54 سم، المسافة بين الجناحين: 115-145 سم، وزن الذكر: 405-730 جم والأنثى: 540-960 جم.
الصفات المميزة: مرزة كبيرة وكباقي أنواع هذا الجنس لها جناحان وذيل طويلان. لون الذكور البالغة بني ورمادي فاتح، تظهر الأنثى والصغار بلون بني داكن مع تاج وحلق كريمي اللون، وشاح الكتف في الأنثى كريمي (أصفر شاحب).
الموائل والمعيشة: توجد بشكل فردي في الأراضي المفتوحة حيث تحلق على ارتفاعات منخفضة ويظهر الجناحان بشكل يشبه رقم سبعة بزاوية مفتوحة، وقد توجد في مجموعات في الأراضي الرطبة الغنية بالغذاء والحقول ذات الري المحوري. طائر انتهازي يتغذى على الطيور الصغيرة ومتوسطة الحجم وبيض وأفرخ الطيور والثدييات الصغيرة والسحالي والحشرات الكبيرة وكذلك على جيف الحيوانات النافقة.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

مُزَرّة بغثاء
Circus macrourus
(Gmelin, 1770)



التوزيع العالمي: مهاجر، نطاق التكاثر يمتد من الجنوب الشرقي لأوروبا إلى غرب منغوليا، يقضي الشتاء في الإقليم المداري الأفريقي وأجزاء من الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
التوزيع في العلا: سُجّل في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 40-48 سم، المسافة بين الجناحين: 100-121 سم، وزن الذكر: 235-416 جم والأنثى: 402-550 جم.
الصفات المميزة: يشبه مرزة (عقاب) مونتاجو، ولكنه يفتقر إلى الحلقات الداكنة على الجناح. الذكور البالغة ذات لون رمادي شاحب مع أسافين سوداء عند طرف الجناح. وللإناث أغطية داكنة وطوق عنق شاحب اللون. الصغار لها وشاح داكن وطوق عنق فاتح اللون.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في مجموعات صغيرة خلال موسم الهجرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة في المناطق المفتوحة، وتفضل الأراضي العشبية والأراضي المزروعة والصحاري ذات الأحراش. تتغذى على الطيور الصغيرة بشكل أساسي وكذلك على الثدييات والحشرات الكبيرة في المناطق التي تقطنها في الشتاء.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، قليل.
حالة الحفظ: قريب من التهديد عالميا (NT) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

مرزة مونتاجوية
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، يتكاثر في عدة مواطن تبدأ من غرب أوروبا والشمال الغربي لقارة أفريقيا إلى أواسط آسيا بينما يقضي الشتاء على امتداد دول الساحل الأفريقي إلى غرب اليمن والجزء الجنوبي لأفريقيا وآسيا.
التوزيع في العلا: سُجل في محمية شرعان.
القياسات: الطول: 39-49 سم، المسافة بين الجناحين: 102-123 سم، وزن الذكر: 227-305 جم والأنثى: 254-445 جم.
الصفات المميزة: طائر أنيق الشكل وله جناحاه طويلان ونحيلان، للجناحين أربع من الريش الطرفي تشبه الأصابع وحلقة داكنة اللون على الجزء العلوي والسفلي للجناحين. لون الذكور رمادي والريش الأولي أسود والجناح من الأسفل بني اللون. لون الأنثى والصغار بني مع حلقات بيضاء على قاعدة الذيل، الجزء البطني للصغار يميل للون الأحمر وتفتقر إلى الحلقات السوداء على الجناحين.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في مجموعات صغيرة خلال موسم الهجرة حيث تحلق على ارتفاعات منخفضة في الأراضي المفتوحة وتفضل السبخات والمستنقعات والمزارع. تتغذي بشكل أساسي على الطيور التي تعشش على الأرض والثدييات، لُوحظ إقليميا (في العلا) أنها تتغذى على السحالي والحشرات الكبيرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

مرزة مستنقعية
Circus aeruginosus



مُرَزّة بغثاء
Circus macrourus



مرزة مونتجوية
Circus pygargus

بيدق آسيوي
Accipiter badius
(Gmelin, 1788)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، نطاق تكاثره يمتد من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا حتى جنوب شرقي آسيا مرورا بالجنوب الغربي للجزيرة العربية وعمان. يقضي الشتاء في غرب الصحراء الكبرى وبعض المناطق في الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: محمية شرعان.
القياسات: الطول: 25-44.5 سم، المسافة بين الجناحين: 48-68 سم، وزن الذكر: 100-193 سم والأنثى: 130-266 سم.
الصفات المميزة: باشق صغير له نتوء بارز وحاد مثلث الشكل على الفك العلوي يشبه الأسنان يسمى بأسنان تومیال دائمة تساعده على قتل فرائسه بسرعة، وما يميز هذا النوع أن لها أجنحة قصيرة وذيلًا طويلًا مستدير الزوايا. للذكور البالغة طوق خلفي على الرقبة والجزء السفلي مقلم وعيونه حمراء. الإناث أدكن لونا ذات عيون صفراء والحاجب أقل احمرارًا من الذكور وعادةً ما تفتقر إلى الطوق الخلفي. الصغار أدكن لونا مع خطوط داكنة من الأسفل ولها خطوط على الحلق.
الموائل والمعيشة: يوجد بشكل فردي أو في أزواج في الأراضي المشجرة المفتوحة والأودية والمتنزهات. يفترس السحالي بشكل أساسي وكذلك الطيور الصغيرة والقوارض والحشرات الكبيرة.
الحالة: مهاجر جزئي.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

باشق مشرقي
Accipiter brevipes
(Severtsov, 1850)

التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، يتكاثر من البلقان امتداداً إلى آسيا الوسطى، يقضي الشتاء بشكل رئيسي في شرق الصحراء الكبرى في أفريقيا.
التوزيع في العلا: سُجل في الغراميل.
القياسات: الطول: 30-37 سم، باع الجناحين: 64-74 سم، وزن الذكر: 140-275 جم والأنثى: 183-290 جم.
الصفات المميزة: يشبه الباشق الأوراسي ولكن عيونه داكنة، والجناحين أطول ومدببة ذات أطراف سوداء حيث تشبه أجنحة الصقور إلى حد كبير. الجزء العلوي لدى الأفراد البالغة رمادي يميل للأزرق عند الذكور، مقلمة بلون برتقالي للجزء السفلي. الأنثى أدكن مع نقوش خطية على الحلق. الصغار بلون بني داكن إلى باهت مع نقوش مموجة داكنة على الجزء السفلي للجسم.
الموائل والمعيشة: يتجمع في أسراب كبيرة حول سفوح الجبال في موسم الهجرة. يتغذى على السحالي والحشرات الكبيرة والطيور الصغيرة والثدييات.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

باشق أوراسي
Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: يعد مهاجراً جزئياً، يتكاثر في جميع أنحاء قارة أوروبا، ويمتد من شمال غرب إفريقيا إلى أقصى الشرق في روسيا واليابان. يقضي فصل الشتاء في جنوب أوروبا وشرق إفريقيا، وصولاً إلى شرق آسيا، بما في ذلك الجزيرة العربية.

التوزيع في العلا: يوجد في كل مناطق العلا باستثناء جبل شيهوب والغراميل وخيبر القديمة.

القياسات: الطول: 28-40 سم، المسافة بين الجناحين: 56-78 سم، وزن الذكر: 105-196 جم والأنثى: 185-350 جم.

الصفات المميزة: جارح ممتلئ الجسم ذو أجنحة عريضة مدببة وذيل طويل مربع الشكل. الجزء العلوي لدى البالغين رمادي في الذكور مع خدود حمراء وخطوط على البطن، الأنثى بخطوط داكنة والصغار بلون بني داكن من الأعلى وخطوط مموجة من جهة البطن، والعيون ذهبية اللون.

الموائل والمعيشة: يعيش بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة في موسم الهجرة كما يوجد في الواحات والمزارع والمنتزهات المشجرة. يصطاد الطيور الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذكور تصطاد فرائس صغيرة في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف.

الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.

الوفرة: غير شائع، شائع.

حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).



حدأة سوداء
Milvus migrans
(Boddaert, 1783)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، مقيم على امتداد جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا حتى الجنوب الشرقي لآسيا وأستراليا، الجماعات المهاجرة تتكاثر على امتداد من غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا إلى شرق آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا وتيماء والغراميل ووادي نخلة وحرة عويرض وحرة خيبر ومحمية شرعان.
القياسات: الطول: 44-66 سم، المسافة بين الجناحين: 120-153 سم، وزن الذكور: 630-928 جم والأنثى: 750-1080 جم.
الصفات المميزة: جارح متوسط الحجم بلون بني داكن ورأس رمادي والذيل ذو شعبتين قليلة التجوف. الجناحان نحيلان وطويلان ولهما ست ريشات سوداء تشبه الأصابع والنوافذ (رقع بيضاء على الجزء الداخلي للجناح) مدمجة باهتة اللون. الصغار لها قناع داكن. لدى هذا النوع القدرة على الثبات في الهواء وكأنها تطفو حيث يتحرك الذيل للتوازن خلال الطيران، الأجنحة مقوسة في العادة.
الموائل والمعيشة: يعثرعليها فرادى أو في جماعات صغيرة وقت الهجرة وتوجد في عدة أماكن وبالتحديد في مناطق التغذية مثل الأراضي الرطبة والمزارع والمستنقعات. طائر انتهازي ويتغذى على مخلفات البشر وجيف الحيوانات النافقة والفقاريات الصغيرة والحشرات الكبيرة أيضا.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع. غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

عقيب شائعة
Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: النويع "عقاب سهيبة" (*B. b. vulpinus*) مسجل في المنطقة ويعتبر من الطيور المهاجرة. يتكاثر في عدة مواطن ابتداء من فنلندا وشرق آسيا إلى أواسط آسيا. يقضى الشتاء في شرقي وجنوبي أفريقيا وجنوبي آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في وادي نخلة وحرة الزبن وجبل الورد وخيبر القديمة وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 40-52 سم، المسافة بين الجناحين: 100-125 سم، وزن الذكر: 427-1183 جم والانثى: 486-1364 جم.
الصفات المميزة: جارح متوسط الحجم ذو ريش متغاير الألوان، يشابه الباز طويل الساق، ولكن بشكل عام يمكن تمييزه بغياب رقعة الجناح الداكنة على القسم السفلي القريبة من الرسغ والرأس داكن اللون، يظهر الذيل بنقوش مموجة ولكن باهتة وعادة ما يحتوي على حلقة طرفية.
الموائل والمعيشة: يوجد في أماكن متعددة خلال الهجرة الخريفية في أسراب كبيرة تصل لبضع مئات. يتغذي بشكل أساسي على القوارض والثدييات الصغيرة الأخرى والسحالي.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سقاوة
Buteo rufinus
(Cretzschmar, 1827)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، نطاق تكاثره يمتد من شمال أفريقيا والبلقان إلى أواسط آسيا، كما يوجد في مجتمعات متفرقة في الجزيرة العربية. يقضي الشتاء بشكل رئيسي في شرق أفريقيا وجنوب آسيا.
التوزيع في العلا: وادي نخلة والغراميل وخيبر القديمة وحرة عويرض ومحمية شرعان.
القياسات: الطول: 43-62 سم، المسافة بين الجناحين: 112-160 سم، وزن الذكر: 590-1281 جم، والأنثى: 945-1760 جم.
الصفات المميزة: باز كبير وطويل الجناحين، له ثلاثة أنماط لونية، باهت وأحمر وداكن. في كل الأنماط تكون حواف الجناح سوداء مع بقع داكنة من أسفل الجناح عند الرسغ. يوجد في النمط الداكن حلقة ذيل طرفية وفي الأنماط الأخرى يكون الذيل بلون أحمر باهت بدون حلقات. شكل الجناح يشبه الرقم سبعة في حالة التحليق.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في أزواج، عادة ما ترى جاثمة في مواقع ثابتة وواضحة، توجد في البيئات الصحراوية المفتوحة وشبه الصحراوية والجبال والأراضي الزراعية. يتكون غذاؤها من الثدييات الصغيرة والسحالي بشكل أساسي ومن الطيور الصغيرة والحشرات الكبيرة في بعض الأحيان. تعشش على الجروف والأشجار.
الحالة: توجد منه جماعات مقيمة ومهاجرة عابرة وكذلك زائر شتوي.
الوفرة: الجماعات المقيمة نادرة بينما تلك التي تعبر وقت الهجرة غير شائعة والأخرى الزائرة شتاءً غير شائعة أيضاً.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

هدهد أوراسي
Upupa epops
Linnaeus, 1758[1]



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في أفريقيا باستثناء الصحراء الكبرى والغابات الاستوائية المطيرة، يتكاثر في أوروبا وآسيا والجزيرة العربية. يقضي الشتاء بشكل أساسي جنوبي نطاق إقامته.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا عدا جبل نهر.
القياسات: الطول: 19-32 سم، الوزن: 46-89 سم.
الصفات المميزة: ذو شكل مميز ويسهل التعرف عليه، لديه عرف كبير ومنقار طويل منحني للأسفل، الريش بني مصفر مع خطوط بيضاء وسوداء على الجناح والذيل.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في أزواج في الأراضي الشجرية المفتوحة والأودية والواحات وبساتين النخيل والمزارع والمنتزهات. يتغذى على اللافقاريات حيث يحفر الأرض لإخراجها. يعشش في الجحور وبين الصخور وفي البنايات وصدوع المنحدرات الصخرية والأشجار.
الحالة: مقيم، مهاجر عابر.
الوفرة: شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

رفراف شائع
Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)[2]

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر على امتداد شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا إلى شرق آسيا وجنوب شرقي آسيا. يقضي الشتاء في جنوبي نطاق إقامته ومنها الشرق الأوسط. التوزيع العلا: سُجل هذا النوع في خيبر القديمة.
القياسات: الطول: 16-18 سم، الوزن: 23-35 جم.
الصفات المميزة: طائر صغير الحجم بلون أزرق زاهٍ وذيل قصير، الجزء البطني مع الخد برتقالي والحلق مع مقدمة الصدر بيضاء ويظهر الجزء العلوي بلون فيروزي (أزرق مخضر) المنقار طويل وأسود اللون. منقار الأنثى برتقالي من قاعدة المنقار إلى طرفه.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في أزواج في مجاري المياه والقنوات والبرك وتجمعات المياه. يتغذى على الأسماك واللافقاريات المائية والشراغيف (صغار الضفادع) حيث يغوص لاصطيادها. طائر خجول وعادة ما يرى كوميض أزرق خاطف محلقا فوق الماء ويصدر نداءات بطبقة صوت عالية.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

رفراف أصدر
Halcyon smyrnensis
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المقيمة، مع انتشار شتوي على امتداد شرق البحر المتوسط إلى جنوب شرق آسيا، يوجد في أماكن متفرقة في الجزيرة العربية خصوصًا في فصل الشتاء.
التوزيع في العلا: خيبر القديمة.

القياسات: الطول: 26-30 سم، وزن الذكر: 85-88 جم والأنثى: 110 جم.
الصفات المميزة: رفراف كبير ذو ألوان زاهية ومنقار طويل ذي لون أحمر داكن. يتباين لون الرأس والبطن وما تحت الجناحين البني الداكن مع لون الحلق والصدر الأبيضين. ويظهر الذيل والظهر بلون فيروزي. يمكن رؤية رقع بيضاء على الجناح مع أطراف سوداء في وضع الطيران.
الموائل والمعيشة: يعثر عليه في أفراد منعزلة على المجاثم المرتفعة بالقرب من الأراضي الرطبة وبساتين النخيل والأراضي الجافة. يتغذى على اللافقاريات والأسماك والبرمائيات كالضفادع والسحالي الصغيرة والقوارض. تغوص للإمساك بفرائسها.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قارية خضراء
Merops cyanophrys
Latham, 1802



التوزيع العالمي: مقيم، شبه أصيل للجزيرة العربية وينتشر خلالها باستثناء الجزء الشمالي والشمالي الشرقي والربع الخالي، يوجد أيضا في فلسطين والأردن.
التوزيع في العلا: سجل في كل أنحاء العلا باستثناء جبل نهر وحرة خيبر وتيماء.
القياسات: الطول: 16-18 سم، الوزن: 15-20 جم.
الصفات المميزة: يعتبر أصغر آكلات النحل حجما في المنطقة، لون الريش أخضر لامع، الوجه والحلق أزرق براق، له خط أسود يمر بالعين (الحاجب) وطوق الحلق أسود وزوائد الذيل قصيرة نسبياً. في حال الطيران يرى الجزء السفلي للجناح بلون أحمر بني. لون الصغار داكن وتفتقر إلى زوائد الذيل.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو مجموعات صغيرة في المناطق المفتوحة المشجرة ومن ضمنها البيئات شبه الصحراوية والأودية والواحات وبساتين النخيل. يتغذى على الحشرات الطائرة، أعشاشها عبارة عن نفق طويل حيث تحفرها على الضفاف الرملية والطينية.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قارية زرقاء الخدين
Merops persicus
Pallas, 1773



التوزيع العالمي: طائر مهاجر، يتكاثر في شمالي غرب أفريقيا وغربي الصحراء الكبرى وبشكل غير منتظم على امتداد دلتا نهر النيل إلى كازاخستان وشمال غرب الهند، يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.
التوزيع في العلا: يوجد في تيماء وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 31 سم، الوزن: 38-56 جم.
الصفات المميزة: آكل نحل كبير ذو لون أخضر وزوائد الذيل طويلة (أطول في الذكور) وخط العين أسود، والخدان والحاجب زرقاء، ورقعة الحلق صفراء وكستنائية اللون. الجزء السفلي للجناح بلون أحمر بني يمكن رؤيته في حال الطيران. الصغار أدكن لونا مع حلق بني محمر وتفتقر إلى الزوائد الذيلية.
الموائل والمعيشة: يوجد في جماعات صغيرة في موسم الهجرة وبشكل أساسي في المناطق ذات الوفرة الغذائية مثل الواحات والأراضي الرطبة وبساتين النخيل والأراضي المزروعة والأودية. يتغذى وهو يطير على الحشرات.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قارية أوروبية
Merops apiaster
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المهاجرة، يتكاثر من غرب أوروبا وشمالي غرب أفريقيا إلى غرب منغوليا وشمالي الهند. يقضي الشتاء بشكل رئيسي في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.

التوزيع في العلا: حرة خيبر وواحات العلا.
القياسات: الطول: 25-29 سم، الوزن: 44-78 جم.
الصفات المميزة: آكل نحل كبير ذو ألوان زاهية مع خط أسود عريض يمر بالعين وتاج كستنائي مع الظهر والجزء السفلي للجناح. الحاجب والريش الأولي والذيل والجزء السفلي فيروزي اللون. الحلق والجوانب (scapulars) صفراء وزوائد الذيل قصيرة نسبيا. الصغار أدكن لونا مع لون أخضر شاحب على الظهر وتفتقر إلى الزوائد الريشية للذيل.
الموائل والمعيشة: يوجد في مجموعات صغيرة وقت الهجرة في المناطق وفيرة الغذاء مثل البيئات الرطبة والواحات وبساتين النخيل والمزارع والأودية. يصطاد الحشرات الطائرة، يصدر أصواتًا بشكل مستمر حيث تساعد في تحديد الأسراب المارة الكبيرة وهي تطير.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قارية خضراء
Merops cyanophrys

قارية أوروبية
Merops apiaster

قارية زرقاء الخدين
Merops persicus

شقراق أوروبي
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758[1]



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، يتكاثر حول حوض البحر المتوسط وغرب أوروبا إلى إيران جنوبا وكازاخستان شرقا. يقضي الشتاء في الصحراء الكبرى الأفريقية.
التوزيع في العلا: سُجل هذا النوع في محمية شرعان.
القياسات: الطول: 31-32 سم، الوزن: 127-160 جم.
الصفات المميزة: ذو لون زاهٍ من الفيروزي المائل للأزرق، المنقار سميك ولون الظهر بني مائل للأحمر والكتف ومؤخرة الظهر مع قاعدة الذيل لونها أزرق ناصع، ريش الطيران أسود. الجزء السفلي فيروزي مائل للزرقة وريش الطيران أزرق ناصع اللون والصغار أدكن لونا.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في مجموعات صغيرة خلال الهجرة في الأراضي المفتوحة المتناثرة الأشجار أو المجاثم الدائمة. يتغذى على اللافقاريات الكبيرة والسحالي الصغيرة والثدييات.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

لَوَّاء أوراسي
Jynx torquilla
Linnaeus, 1758[2]

التوزيع العالمي: مهاجر، مواطن تكاثره تمتد من غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا إلى الشرق الأقصى لروسيا وشمال شرق الصين. يقضي الشتاء في جنوب الصحراء العظمى في أفريقيا وجنوبي آسيا وجنوبي شرق آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا.
القياسات: الطول: 16-18 سم، الوزن: 30-50 جم.
الصفات المميزة: نقار خشب صغير ذو ألوان مموهة مدبب المنقار والجزء العلوي مخطط برمادي وبني وخط العين داكن، ريش الحلق منفوش والجزء السفلي باهت مخطط بلون بني والذيل طويل. له خط داكن اللون من التاج إلى الظهر.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى منعزل ويصعب العثور عليه (مراوغ). يوجد في أماكن متعددة في موسم الهجرة وبشكل رئيسي في الأراضي المشجرة المفتوحة والواحات والوديان والمنتزهات وبساتين النخيل. يتغذى على اللافقاريات على الأرض وبشكل أساسي على النمل حيث يصطادها بواسطة لسانه الطويل اللزج حيث يلتقط به النمل.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

قراع عربي
Dendropicos dorae
(Bates & Kinnear, 1935)



التوزيع العالمي: مقيم وأصيل للجزيرة العربية، ينتشر في سلسلة جبال الحجاز.
التوزيع في العلا: حرة الزبن وجبل شيهوب.
القياسات: الطول: 18 سم، الوزن: 41.5 جم.
الصفات المميزة: نقار خشب صغير بلون بني باهت، الجناح والذيل مخطط باللونين الأبيض والأسود وبقعة البطن بلون أحمر شاحب في الإناث. للذكر تاج (عرف) أحمر، وقفا العنق أحمر كذلك.
الموائل والمعيشة: يتواجد على شكل أفراد أو أزواج في الأراضي الصخرية المشجرة والمنحدرات الجبلية والأودية التي تسودها نباتات الاكاشيا الكبيرة. يتغذى على الحشرات حيث يحفر جذوع الأشجار لاستخراجها. يعشش في فجوات في جذوع الأشجار التي يحفرها.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: قريب من التهديد عالميا (NT) ومعرض للانقراض إقليميا (VU).

عوسق
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في معظم أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. يقضي الشتاء في نطاق إقامته الجنوبي والغربي وفي جنوب وجنوب شرقي آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا.
القياسات: الطول: 27-35 سم، وزن الذكر: 136-252 جم والأنثى: 154-314 جم.
الصفات المميزة: صقر متوسط الحجم مع خطوط مدمجة تشبه الشنب، والجناح طويل ونحيل والذيل ذو حلقة طرفية عريضة سوداء. منقط بكثافة على ظهره ومقدمة الجناح بالبني المحمر، الجزء السفلي باهت اللون. الذكر ذو رأس وذيل رمادي.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في أزواج تنتشر في البيئات المفتوحة والمكشوفة. ويتغذى على الثدييات الصغيرة بشكل أساسي وبشكل ثانوي على الحشرات الكبيرة والسحالي والطيور الصغيرة. يسقط على فرائسه من المجاثم العالية أو يحوم فوقها ثم ينقض عليها. يعشش في التجاويف والجحور في الصخور والبنايات والنباتات.
الحالة: مقيم، مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

صقر أسحم
Falco concolor
Temminck, 1825

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في معظم أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. يقضي الشتاء في نطاق إقامته الجنوبي والغربي وفي جنوب وجنوب شرقي آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا.
القياسات: الطول: 27-35 سم، وزن الذكر: 136-252 جم والأنثى: 154-314 جم.
الصفات المميزة: صقر متوسط الحجم مع خطوط مدمجة تشبه الشنب، والجناح طويل ونحيل والذيل ذو حلقة طرفية عريضة سوداء. منقط بكثافة على ظهره ومقدمة الجناح بالبني المحمر، الجزء السفلي باهت اللون. الذكر ذو رأس وذيل رمادي.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في أزواج تنتشر في البيئات المفتوحة والمكشوفة. ويتغذى على الثدييات الصغيرة بشكل أساسي وبشكل ثانوي على الحشرات الكبيرة والسحالي والطيور الصغيرة. يسقط على فرائسه من المجاثم العالية أو يحوم فوقها ثم ينقض عليها. يعشش في التجاويف والجحور في الصخور والبنايات والنباتات.
الحالة: مقيم، مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

شويهين أوراسي
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

التوزيع العالمي: صقر مهاجر، يتكاثر على امتداد أوروبا إلى الشرق الأقصى لروسيا وشرقي الصين، يقضي الشتاء بشكل أساسي في جنوب الصحراء العظمى في أفريقيا.

التوزيع في العلا: سُجل هذا النوع في خيبر القديمة.

القياسات: الطول: 28-36 سم، المسافة بين الجناحين: 68-84 سم، وزن الذكر: 131-232 جم والانثى: 141-340 جم.

الصفات المميزة: صقر صغير الحجم رشيق ذو أجنحة طويلة ونحيلة. الجزء العلوي للذكور داكن بلا نقوش، الوجه أبيض مع شارب أسود، الجزء السفلي مخطط بغزارة بألوان تميل للأبيض. يغطي الرجل ريش ذو لون محمر. صغاره قريبة الشبه بصغار الصقر الاسحم ولكنها تفتقر إلى حلقة الذيل الطرفية.

الموائل والمعيشة: يوجد فرادى في الغالب وفي أماكن متعددة وقت الهجرة وبالتحديد حول الأراضي الرطبة والأراضي الشجرية المفتوحة والمزارع. يصطاد فرائسه وهو يطير يقتنص الحشرات الكبيرة والطيور الصغيرة.

الحالة: مهاجر عابر.

الوفرة: قليل.

حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.



شاهين
Falco peregrinus
Tunstall, 1771



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، ينتشر في شتى أنحاء العالم باستثناء القطب المتجمد الجنوبي. تحت النوع؛ "كوبج" (*F. p. pelegrinoides*) يعتبر نويعا مقيما ويوجد بشكل مبعثر خلال شمال أفريقيا إلى العراق والجزيرة العربية.

التوزيع في العلا: سُجل في حرة عويرض ووادي نخلة والغراميل.

القياسات: الطول: 36-58 سم، المسافة بين الجناحين: 79-114 سم، وزن الذكر: 410-1060 جم والأنثى: 595-1600 جم.

الصفات المميزة: صقر كبير وقوي ذو شارب عريض داكن والجناحان عريضان مدببا الطرفين، والذيل قصير مربع الشكل. الجزء السفلي للذكور مقلم بغزارة باللون الأبيض. الصغار ذات خطوط ممووجة للجزء السفلي بلون بني محمر باهت. الصقر البربري أصغر حجما والشارب أدق والجزء السفلي بلون بني محمر باهت ذو خطوط رفيعة والقفا بلون بني محمر.

الموائل والمعيشة: يوجد بشكل فردي أو زوجي ويفضل الأراضي الغنية بالفرائس مثل الأراضي الرطبة والمزارع في وقت الهجرة. يتكاثر في الجبال والأراضي شبة الصحراوية ذات الحروف والمنحدرات. يعتبر هذا النوع أسرع نوع من الطيور في العالم ويقبض على فرائسه بالانقضاض عليها من الأعلى وبشكل رئيسي الطيور. يعشش على المنحدرات والحواف الصخرية.

الحالة: مقيم، مهاجر عابر، زائر شتوي.

الوفرة: نادر، نادر، نادر.

حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ومعرض للانقراض إقليميا (VU).

درة مطوقة
Alexandrinus krameri
(Scopoli, 1769)

التوزيع العالمي: طائر مقيم، متوطن للصحراء الكبرى وجنوب آسيا. تشكل الأفراد الهاربة من الأسر عشائر وحشية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا وتيماء.
القياسات: الطول: 37-43 سم، الوزن: 95-143 جم.
الصفات المميزة: ببغاء متوسط الحجم ذو ألوان خضراء والذيل رفيع وطويل جدا والمنقار أحمر. للذكر ذقن أسود وحلقة العنق سوداء وردية.
الموائل والمعيشة: يوجد في مجموعات صغيرة مكونا أسرابًا تصدر نداءات مزعجة في الواحات وبساتين النخيل والمنتزهات الخضراء والحدائق. يتغذى على الثمار والبذور والرحيق. يعشش في تجاويف الأشجار وفي بعض الأحيان في المباني.
الحالة: مقيم (مدخل)،
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

درة إسكندرية
Palaeornis eupatria
(Linnaeus, 1766)

التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المقيمة، المتوطنة جنوبي وجنوب شرقي آسيا. تشكل الأفراد الهاربة من الأسر عشائر وحشية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: واحات العلا.
القياسات: الطول: 50-62 سم، الوزن: 198-258 جم.
الصفات المميزة: يميز هذا النوع بكبر حجمه وذيله فارع الطول ورأس كبير ذو منقار أحمر ناصع، ورقعات الكتف بلون أحمر داكن. لون الذقن عند الذكور أسود وطوق العنق وردي وأسود أعرض من طوق الدرة وردية الطوق.
الموائل والمعيشة: يوجد في مجموعات صغيرة ذات أصوات صاخبة في الواحات وبساتين النخيل والحدائق العامة والمنتزهات. يتغذى على الفواكه والبذور والرحيق. يعشش في فجوات الأشجار وفي بعض الأحيان في شقوق البنايات.
الحالة: مقيم (مدخل).
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: قريب من التهديد عالميا (NT) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

صفارية أوراسية
Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، يتكاثر على امتداد من شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا إلى شرق منغوليا مع وجود مجموعات صغيرة تتكاثر في الجزيرة العربية، يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.
التوزيع في العلا: سُجل في حرة خيبر وحرة عويرض وخيبر القديمة وكذلك في واحة العلا.
القياسات: الطول: 24-25 سم، الوزن: 42-102 جم.
الصفات المميزة: يمكن تمييز الذكر بسهولة حيث الرأس والجسم صفراء اللون، والبقعة ما بين العين والمنقار وكذلك والذيل سوداء اللون. الجزء العلوي للأنثي والصغار يظهر بلون أخضر مصفر والجزء السفلي باهت مخطط والجناح بني غامق.
الموائل والمعيشة: طائر خجول يصعب رؤيته يوجد بشكل فردي أو في أزواج، عادة ما يقطن الأراضي الشجرية المفتوحة والمتنزهات الخضراء والحدائق. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات الصغيرة والفواكه وفي بعض الأحيان على الرحيق وحبوب اللقاح والبذور.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

درة إسكندرية
Palaeornis eupatria

درة إسكندرية
Alexandrinus krameri

صفارية أوراسية
Oriolus oriolus

غراب أدرع
Corvus ruficollis
Lesson, 1831



التوزيع العالمي: غراب مقيم، ينتشر من شمال أفريقيا إلى جنوب باكستان وأواسط آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد هذا النوع في واحة العلا ووادي نخلة وحرة عويرض وشرعان والغراميل وحرة الزبن وحرة خيبر وجبل نهر.
القياسات: الطول: 52-56 سم، المسافة بين الجناحين: 103-120 سم، الوزن: 500-647 جم.
الصفات المميزة: غراب كبير أسود يوجد في الصحاري، الجناحان والمنقار طويلة ونحيلة نسبيا، الذيل يشبه شكل الألماس. يتميز هذا النوع بلون الرقبة البني حيث لا تكون ظاهرة إلا من مسافة قريبة وتحت إضاءة مناسبة.
الموائل والمعيشة: يتواجد على شكل أفراد أو أزواج في الصحاري والأراضي شبه الصحراوية والجبال الجرداء وكذلك بالقرب من مواطن البشر. طائر قارت انتهازي حيث يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات والفقاريات الصغيرة وجيف الحيوانات النافقة وبقايا الطعام من مخلفات البشر. يعيش على الأشجار والجروف وأعمدة الكهرباء.
الحالة: مقيم.
الوفرة: يوجد بأعداد وافرة.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

غداف
Corvus rhipidurus
Hartert, 1918



التوزيع العالمي: غراب مقيم ويوجد جنوب وشرق الجزيرة العربية وشرق أفريقيا وأجزاء من الصحراء الكبرى بأفريقيا.
التوزيع في العلا: سُجل في واحة العلا وحرة خيبر وحرة عويرض وشرعان والغراميل ووادي نخلة وجبل شيهوب.
القياسات: الطول: 46-47 سم، المسافة بين الجناحين: 103-110 سم، الوزن: 512-734 جم.
الصفات المميزة: غراب أسود اللون متوسط إلى كبير الحجم ذو منقار ثخين وكبير الجناحين أعرض وأقصر من الغراب أسمر الرقبة، له ذيل مروحي الشكل قصير مقارنة بحجمه.
الموائل والمعيشة: يوجد في مجموعات صغيرة إلى متوسطة العدد في المناطق الصخرية أو الصحاري ذات المنحدرات والجروف المرتفعة وكذلك يوجد بالقرب من مواطن البشر. من آكلات النباتات واللحوم، ويتغذى بشكل رئيسي على الحبوب والفواكه الصغيرة والتمور واللافقاريات وبقايا الطعام من مخلفات البشر. يعشش على الجروف الصخرية.
الحالة: مقيم.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

دغناش أمغر
Lanius collurio
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: يعتبر من الأنواع المهاجرة، يتكاثر على امتداد من غرب أوروبا إلى شرق كازاخستان وغرب سيبيريا. يقضي الشتاء في شرق وجنوب أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في وادي نخلة وحرة خيبر وواحة العلا.
القياسات: الطول: 17-18 سم، الوزن: 23-34 جم.
الصفات المميزة: صرد صغير الحجم، لون الرأس رمادي في الذكور وله قناع أسود والجزء العلوي كستنائي والجزء السفلي بلون أبيض مائل للوردي، الذيل أسود اللون. الأنثى ذات ألوان شاحبة والجزء السفلي مموج. الصغار تشبه الأنثى ولكن الجزء السفلي مقلم والذيل بني بأطراف بيضاء.
الموائل والمعيشة: يوجد بشكل فردي أو في مجموعات قليلة الأفراد في موسم الهجرة وترى في المناطق الخضراء المفتوحة متناثرة الأشجار والأودية والواحات والأراضي المزروعة والمنتزهات. يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات الكبيرة ولكنه يأكل السحالي والقوارض والطيور الصغيرة أيضا حيث يُعلق فرائسه بغرسها على أشواك الأشجار.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

دغناش داوري
Lanius isabellinus
Ehrenberg, 1833



التوزيع العالمي: صرد مهاجر يتكاثر في آسيا وإيران، يقضي الشتاء في شرق وجنوب الجزيرة العربية وشرق أفريقيا وكذلك في الساحل الأفريقي.
التوزيع في العلا: سُجل في حرة الزبن ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 16.5-18 سم، الوزن: 26-33.5 جم.
الصفات المميزة: صرد صغير ذو لون شاحب. الجزء العلوي ذو لون رمادي رملي، والحاجب كريمي باهت. قناع الأنثى والصغار ذو ريش بارز يبدو مبللًا ولها نقوش مموجة النمط على الجزء السفلي.
الموائل والمعيشة: يوجد في أفراد أو مجموعات صغيرة وينتشر بشكل رئيسي في الأراضي الخضراء المفتوحة ذات الأشجار المتناثرة وفي الأراضي المزروعة وكذلك في المنتزهات. يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات الكبيرة وفي بعض الأحيان على الفقاريات الصغيرة حيث يهبط على فرائسه من مجاثم ذات ارتفاعات منخفضة.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

صُرَد صغير
Lanius minor
Gmelin, 1788



التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المهاجرة، يمتد نطاق تكاثره من جنوب أوروبا إلى كازاخستان، يقضي أفراد هذا النوع الشتاء في جنوب قارة أفريقيا.
التوزيع في العلا: سُجل هذا النوع في جبل الورد وتيماء وحرة خيبر وحرة الزبن.
القياسات: الطول: 19-23 سم، الوزن: 41-62 جم.
الصفات المميزة: صرد متوسط الحجم ذو منقار سميك، وقناع أسود مع الجبهة، للأجنحة نقوش بيضاء. الجزء العلوي للجسم رمادي والحلق أبيض والجزء السفلي يميل للون الوردي. تفتقر الأفراد غير البالغة إلى اللون الأسود على الجبهة، والجزء السفلي لأجسامها أبيض اللون. زوائد الذيل الريشية دائمة.
الموائل والمعيشة: يوجد في أفراد منعزلة في البيئات المفتوحة ذات الحشائش والشجيرات المتجمعة وكذلك المزارع والمنتزهات. يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات الكبيرة حيث يهبط عليها من مجاثمه أو عندما يحوم فوقها. نادرًا مايغرس فرائسه ويعلقها على أشواك الأشجار.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

صُرَد كبير
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في أواسط وشمال وغرب أوروبا ومن آسيا الوسطى حتى منغوليا وجنوب آسيا وشمال أفريقيا، يقضي الشتاء على امتداد من بريطانيا إلى كازاخستان وفي جنوبي نطاق إقامته.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا باستثناء واحة العلا.
القياسات: الطول: 24-25 سم، الوزن: 48-81 جم.
الصفات المميزة: صرد كبير الحجم، الجزء العلوي له رمادي فاتح والقناع أسود اللون ولكنه لا يمتد إلى الجبهة كما في الصرد الصغير. يوجد بقع بيضاء على الذيل والأجنحة والريش الأولى وحوافه وكذلك الصف الثالث لريش الطيران (الريش الثالثي)
الموائل والمعيشة: عادة ما يوجد بشكل فردي أو في أزواج في مجاثم ثابتة دائمة ومناطق الأحراش ذات النباتات الشوكية. يتغذى بشكل أساسي على الثدييات الصغيرة ومفصليات الأرجل الكبيرة حيث يغرسها في أشواك الأشجار بشكل مستمر. يعشش في الأحراش والأشجار.
الحالة: مقيم، مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

دغناش شامي
Lanius senator
Linnaeus, 1758

التوزيع العالمي: طائر مهاجر، يبدأ نطاق تكاثره من حوض البحر المتوسط إلى إقليم القوقاز وإيران. يقضي الشتاء في دول الساحل الأفريقي.
القياسات: الطول: 18-19 سم، الوزن: 21-59 جم.
الصفات المميزة: صرد صغير الحجم وكبير الرأس، للأفراد البالغة قلنسوة أو قنة حمراء وقناع أسود والظهر أسود، وشاح الكتف مع أسفل الظهر أبيض. تظهر الصغار بلون رمادي شاحب ولها نقوش مموجة مع بقع صغيرة بلون بني فاتح على الجزء العلوي ووشاح الكتف يميل للأبيض والذيل بني داكن.
الموائل والمعيشة: يوجد في أفراد منعزلة في المناطق المفتوحة المشجرة والمناطق الزراعية والواحات والمنتزهات. يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات الكبيرة وفي بعض الأحيان على الفقاريات الصغيرة حيث يهبط على فرائسه من مجاثمه. نادرا ما يعلق فرائسه بغرسها على أشواك الأشجار.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: قريب من التهديد عالميا (NT) وغير مهدد إقليميا (LC).

دغناش مبرقع
Lanius nubicus
Lichtenstein, 1823



التوزيع العالمي: يعتبر من الأنواع المهاجرة، يتكاثر على امتداد البلقان إلى إيران. يقضى الشتاء في دول الساحل الأفريقي والجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة خيبر وواحة العلا وحرة الزبن ومحمية شرعان.
القياسات: الطول: 17-18.5 سم، الوزن: 14.5-30 جم.
الصفات المميزة: صرد صغير وقصير، نحيل المنقار وله ذيل رفيع وطويل. لون الجزء العلوي للذكور أسود وأبيض وكذلك الجبهة ووشاح الكتف، الريش الأولي أبيض. الأنثى داكنة اللون والصغار ذات لون رمادي مع نقوش مموجة وبقع الريش الأولي بارزة والعجز داكن اللون (مقارنة مع صغار دغناش شامي).
الموائل والمعيشة: يتواجد على شكل أفراد في الأراضي الشجرية المفتوحة والأودية والمنتزهات والأراضي الزراعية. يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات وأحيانا على الفقاريات الصغيرة. يهبط على فرائسه من المجثم وأحيانا يطارد الحشرات الطائرة، عادة ما يغرز فرائسه على أشواك الأشجار.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



مكاء
Alaemon alaudipes
(Desfontaines, 1789)



التوزيع العالمي: قبرة مقيمة، توجد عبر شمال أفريقيا والجزيرة العربية إلى شمالي غرب الهند.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل ووادي نخلة وجبل نهر ومحمية شرعان وحرة عويرض وخيبر.
القياسات: الطول: 19-23 سم، الوزن: 30-51 جم.
الصفات المميزة: قبرة كبيرة ونحيلة ذات لون رملي ومنقار طويل منحني للأسفل وأرجل طويلة. الجناحان عريضان ذوا نقوش بيضاء وسوداء والذيل أسود وينكشف خلال الطيران. تكون نقوش الرأس والصدر أكثر وضوحا لدى الذكور.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في أزواج تجري على الرمال في الصحاري والأراضي شبه الصحراوية والتلال الرملية. تتغذى على الأرض وتأكل اللافقاريات بشكل أساسي والسحالي أحيانا وتتغذى على البذور والأجزاء الخضرية للنباتات. تحفر في الأرض لاستخراج فرائسها. تعشش في تجاويف على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قبرة شدقاء
Ramphocoris clotbey
(Bonaparte, 1850)

التوزيع العالمي: مقيم، مع انتشار شتوي، يوجد في شمالي غرب أفريقيا وشمالي الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: سُجل في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 17-18 سم. الوزن: 45-55 جم.
الصفات المميزة: قبرة كبيرة الحجم ممتلئة ذات منقار باهت اللون فريد بسماكته، الذيل قصير والجزء العلوي للجسم بني والخدود داكنة وباهتة من الوسط والصدر ذو بقع كثيفة داكنة اللون. في حال الطيران يمكن رؤية لون داكن لريش الطيران ذي الحدود البيضاء، مع نقوش على الذيل.
الموائل والمعيشة: يوجد في أفراد منعزلة أو في مجموعات صغيرة في الصحاري الصخرية والأودية والمنحدرات الصخرية وحقول الصهارة البركانية والأراضي الزراعية. يتغذى على الأرض وبشكل أساسي على البذور واللافقاريات والأجزاء الخضرية للنباتات ويتغذى على السحالي في بعض الأحيان. يعشش في الحفر السطحية على الأرض.
الحالة: مقيم، زائر شتوي.
الوفرة: نادر، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

حمرة صبغاء
Ammomanes cinctura
(Gould, 1839)



التوزيع العالمي: قبرة مقيمة، تتواجد في شمال أفريقيا ومن الجزيرة العربية إلى باكستان.
التوزيع في العلا: توجد في الغراميل ووادي نخلة وحرة عويرض وشرعان وجبل نهر.
القياسات: الطول: 14 سم، الوزن: 14-23 جم.
الصفات المميزة: قبرة صغيرة الحجم بدون نقوش سائدة، باهتة اللون، لها رأس مستدير ومنقار يميل للون الوردي، مما يمنحها مظهراً أنيقا، وغالبًا ما تقف في وضع مستقيم. في حال الطيران يمكن رؤية حلقة طرفية سوداء على الذيل ذي اللون البني المحمر. لها صوت مميز يساعد في التفريق بينها وبين قبرة الصحراء.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في أزواج في المناطق الرملية والحصوية المفتوحة، وتجري لمسافات قصيرة ثم تتوقف. تتغذى على الأرض، وبشكل رئيسي على البذور واللافقاريات. تعشش في حفر صغيرة على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

حمرة صحراوية
Ammomanes deserti
(Lichtenstein, 1823)



التوزيع العالمي: مقيم، يوجد في شمال أفريقيا ودول القرن الأفريقي والجزيرة العربية إلى أوزباكستان.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا باستثناء تيماء.
القياسات: الطول: 15-17 سم، الوزن: 20-30 جم.
الصفات المميزة: قبرة متوسطة الحجم قوية ذات لون سائد يميل للرمادي لها منقار مائل للأصفر طويل وقوي. في حال الطيران يمكن رؤية حلقة طرفية عريضة على الذيل وبلون أسود متداخل. تتباين الألوان بين النويعات بشكل عام.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في أزواج إما تمشي أو تجري في كل البيئات الجافة ومنها الصخرية والحصوية والرملية وحقول الصهارة البركانية والأودية. تتغذى على الأرض وبشكل رئيسي على البذور واللافقاريات. تعشش في حفر عميقة على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أكبد أسود تاج
Eremopterix nigriceps
(Gould, 1839)

التوزيع العالمي: مقيم، يوجد على امتداد من دول الساحل الأفريقي حتى القرن الأفريقي ومن الجزيرة العربية حتى شمال غربي الهند.
التوزيع في العلا: يوجد خارج المناطق المحمية جنوب حرة الزبن.
القياسات: الطول: 10-11 سم، الوزن: 12-16 جم.
الصفات المميزة: قبرة صغيرة تشبه العصفور لها منقار قصير وسميك. الجزء العلوي مخطط باللون البني الرملي. الجزء السفلي والتاج في الذكور البالغة أسود، ولون الخد مع الجبهة أبيض. الجزء السفلي للأنثى باهت والعلوي والصدر ذو خطوط صغيرة وباهتة. يظهر جانبا الذيل بلون أسود في حال الطيران.
الموائل والمعيشة: يوجد في أسراب صغيرة في البيئات شبه الصحراوية والسهول الرملية الحصوية والتلال الساحلية. يبحث عن المؤونة على الأرض ويتغذى على البذور واللافقاريات. يعشش على الأرض في حفر صغيرة.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قُبَّرة عربية
Eremalauda eremodites
(Meinertzhagen, 1923)



التوزيع العالمي: مقيم، شبه أصيل لحد كبير للجزيرة العربية، يوجد في الغالب في المملكة العربية السعودية ولكن تتوزع ساكانت منه في الأردن وفلسطين وجنوب سوريا والكويت واليمن وعمان.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة عويرض والغراميل وشرعان.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن (غير متوفر).
الصفات المميزة: قبرة صغير ذات لون رملي مع منقار يميل للون الوردي وأجنحة عريضة. الجزء العلوي ذو نقوش خطية كثيفة والجزء السفلي سائد البياض. نقوش الوجه واضحة ويوجد امتداد أسود مميز من العين للخلف يشبه الدمعة. جوانب الذيل سوداء يمكن رؤيتها خلال الطيران.
الموائل والمعيشة: يوجد بشكل فردي أو في أزواج خلال موسم التكاثر وترى في مجموعات صغيرة بعد موسم التكاثر وقبله. يجري لمسافات قصيرة ثم يتوقف بشكل مفاجئ. يوجد في الأراضي الرملية المسطحة المفتوحة والبيئات شبه الصحراوية الحصوية والصخرية. يتغذى على الأرض على البذور واللافقاريات. يعشش في حفر صغيرة على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قُبَّرة صبيعاء صغيرة
Alaudala rufescens
(Vieillot, 1820)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في أيبيريا وشمال أفريقيا وبلاد الشام. يقضي الشتاء في تركيا وشمال الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: سُجل في محمية شرعان وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 13-14 سم، الوزن: 20-27 جم.
الصفات المميزة: قبرة صغيرة مخططة ذات ذيل قصير ومنقار سميك وقصير، الجزء السفلي لها أبيض والصدر مخطط وزوائد ريش الطيران الأولي أسود مقارنة بالقبرة ذات الأصابع القصيرة الكبيرة. عادة ما ترفع ريش التاج. الذيل داكن اللون ذو حواف بيضاء يمكن رؤيتها خلال الطيران.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في مجموعات صغيرة في السهول المفتوحة الخضراء الرملية أو الحصوية والمناطق الزراعية. تجري سريعًا بشكل متقطع للبحث عن المؤونة مثل اللافقاريات والبذور وتتغذي أحيانًا على الفواكه وعلى النباتات البصلية.
الحالة: مهاجر عابر. زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قُبَّرة صبيعاء عربية
Calandrella eremica
(Reichenow & Peters, 1932)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المقيمة، يتواجد في كلٍ من جنوبي غرب الجزيرة العربية ودول القرن الأفريقي.
التوزيع في العلا: توجد في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 12.5-13.5 سم، الوزن: ~ 24 جم.
الصفات المميزة: قبرة صغيرة ذات منقار دقيق وداكن والجزء العلوي لها مخطط بلون بني يميل للرمادي، الجزء السفلي ذو لون شاحب سائد مع نقوش داكنة على جوانب الحلق. التاج مميز ذو لون بني مائل للأحمر وفي بعض الأحيان ترفعه ليكون قلنسوة أو عرفا.
الموائل والمعيشة: توجد في أزواج أو في مجموعات صغيرة على ارتفاع يصل 1300 متر على الهضاب الصخرية والحرات والأراضي العشبية المفتوحة الضيقة أو الصغيرة. تتغذى على الأرض وعلى الأرجح أنها تأكل اللافقاريات والبذور.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قُبَّرة صُبَيْعاء كبيرة
Calandrella brachydactyla
(Leisler, 1814)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر من حوض البحر المتوسط إلى منغوليا ويقضي الشتاء من شمال أفريقيا إلى دول الساحل الأفريقي ومن الجزيرة العربية إلى شمالي غرب الهند.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة خيبر ووادي نخلة وحرة الزبن.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 16-25 جم.
الصفات المميزة: قبرة صغيرة الحجم ذات منقار سميك وباهت اللون. الجزء العلوي مخطط بكثافة ورملي اللون، ومنتصف الجناح متباين الألوان. والجزء السفلي أبيض سائد مع بقع سوداء على جانبي الحلق. التاج مخطط باللون البني وقد يشوبه لون أحمر. يرى الذيل بلون داكن عند الطيران.
الموائل والمعيشة: يتواجد عادة على شكل أفراد أو على شكل مجموعات صغيرة في المناطق الرملية أو الصخرية المفتوحة والأراضي شبه الصحراوية والمناطق الزراعية. يتغذى على الأرض وبشكل رئيسي على اللافقاريات والبذور.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قبرة الصحراء المقرنة (قبرة تمنك القرناء)
Eremophila bilopha
(Temminck, 1823)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المقيمة، يوجد في شمال أفريقيا ومن شمال الجزيرة العربية إلى سوريا.
التوزيع في العلا: يوجد في الغراميل وحرة عويرض ووادي نخلة وحرة خيبر وكذلك في محمية شرعان.
القياسات: الطول: 13-15 سم، الوزن: 38-39 جم.
الصفات المميزة: قبرة صغيرة الحجم أنيقة الشكل ذات منقار رفيع داكن. لها تاج مميز يشبه القرن بلون أسود ولها قناع وطوق غير متصل أسود، الرأس أبيض اللون. لونها العام أحمر رملي والجزء العلوي مخطط والسفلي أبيض سائد. للذيل ألوان داكنة ترى خلال الطيران. يتميز الذكر بنقوش حادة بارزة.
الموائل والمعيشة: تتواجد غالبا على شكل أزواج أو مجموعات صغيرة في الأراضي المسطحة الصخرية المفتوحة أو الرملية المدمجة ذات الغطاء النباتي المتناثر. تتغذى على الأرض وبشكل أساسي على البذور وأحيانًا على اللافقاريات والثمار. تعشش في حفر عميقة في الأرض.
الحالة: مقيم، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قُبَّرة شائعة
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: نوع مقيم، ذو انتشار واسع يمتد من غرب أوروبا وشمال أفريقيا إلى شرق آسيا مرورا بالجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: تم تسجيل تواجده في حرة عويرض والغراميل وحرة الزبن ومحمية شرعان وحرة خيبر وكذلك تيماء وخيبر القديمة ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 17-19 سم، الوزن: 35-50 جم.
الصفات المميزة: قبرة كبيرة الحجم قصيرة الذيل ذات منقار طويل وتاج شائك، لونها العام رملي، الجزء العلوي مخطط والسفلي فاتح اللون مع خطوط داكنة على الصدر. خلال الطيران يظهر الذيل قصير داكن جوانبه بلون بني محمر.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في أزواج خلال موسم التكاثر وفي مجموعات صغيرة عدا ذلك. يوجد في المناطق المفتوحة الصخرية أو الرملية المدمجة وحول القرى والمدن والحقول الزراعية. يتغذى على الأرض وبشكل رئيسي على اللافقاريات والبذور. يعشش في حفر على الأرض.
الحالة: مقيم،
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

قبرة صبيعاء صغيرة
Alaudala rufescens

قبرة صبيعاء عربية
Calandrella eremica

قُبَّرة صُنبُعاء كبيرة
Calandrella brachydactyla

قبرة الصحراء المقرنة
Eremophila bilopha

♂

قبرة شائعة
Galerida cristata

مكاء
Alaemon alaudipes

قبرة شدقاء
Ramphocoris clotbey

♂

حمرة صبغاء
Ammomanes cinctura

حمرة صحراوية
Ammomanes deserti

أكبد أسود تاج
Eremopterix nigriceps

♂

قبرة عربية
Eremalauda eremodites

خطاف عجز
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المهاجرة، يتكاثر على امتداد من شمال أفريقيا وأوروبا حتى أواسط آسيا. يقضي الشتاء بشكل رئيسي في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي جنوب غرب آسيا أيضا.
التوزيع في العلا: يوجد خارج المناطق المحمية جنوب غرب العلا.
القياسات: الطول: 13-14 سم، طول الجناحين: 26-29 سم، الوزن: 10-23 جم.
الصفات المميزة: سنونو لونه العام أسود وأبيض والذيل قصير ذو شعبتين وآخر الظهر والجزء السفلي للجسم أبيض ناصع حيث يمكن رؤيته بوضوح خلال الطيران.
الموائل والمعيشة: يتغذى على الحشرات حيث يصطادها وهو يطير بالقرب من الأراضي الرطبة والأراضي الأخرى المفتوحة يطير بشكل ثابت عاليا في الهواء.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سنونو أحمر عجز
Cecropis daurica
Linnaeus, 1771

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر على امداد من جنوب أوروبا إلى شرق آسيا. يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب آسيا وشمال أستراليا.
التوزيع في العلا: تم تسجيله في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 17 سم، طول الجناحين: 32-34 سم، الوزن: 19-30 جم.
الصفات المميزة: سنونو ذو شكل أنيق مع ذيل طويل ذي شعبتين يشبه سنونو (خطاف) المخازن ولكن يميزه أن الجزء الأخير من الظهر وطوق الرقبة بني محمر يميل للبرتقالي وجانبي الرأس باهتا اللون. الجزء السفلي ذو خطوط رفيعة وبينها ريش أبيض منفوش والعجز بلون أسود ومربع الشكل.
الموائل والمعيشة: يتغذى بينما يطير على الحشرات بالقرب من الأراضي الرطبة والحقول الزراعية، يحوم فوق الأراضي الخضراء المنخفضة عاليا في السماء.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سنونو شائع
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: طائر مهاجر، يتكاثر في أوراسيا وأمريكا الشمالية. يقضي الشتاء على امتداد من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب شرق أفريقيا إلى شمال أستراليا وأمريكا الجنوبية.
التوزيع في العلا: تم تسجيل وجود هذا النوع في كل أنحاء العلا عدا جبل شيهوب وجبل نهر.
القياسات: الطول: 17-19 سم، باع الجناحين: 32-34 سم، الوزن: 16-24 جم.
الصفات المميزة: أنيق الشكل بلون أسود مزرق وذيل طويل ذي شعبتين مع نقاط صغيرة بيضاء. له جبهة وحلق حمراء بنية منفصلة عن طوق الصدر الأسود والبطن الأبيض.
الموائل والمعيشة: تتغذى على الحشرات وهي تطير بالقرب من الأراضي الرطبة أو الحقول الزراعية. لها قدرة طيران توصف بأنها رشيقة وبهلوانية حيث تلتف بسرعة عند قربها من الأرض. تكوّن أسرابا كبيرة وتجثم على الكابلات الكهربائية والسياج.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

عوهق جرفي أوراسي
Ptyonoprogne rupestris
(Scopoli, 1769)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر على امتداد من جنوب أوروبا إلى شرق آسيا، يقضي الشتاء في غرب أفريقيا وعلى امتداد نهر النيل وجنوب آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد خارج المناطق المحمية شمال شرقي واحات العلا.
القياسات: الطول: 14-15 سم، طول الجناحين: 32-34 سم، الوزن: 17-33 جم.
الصفات المميزة: ذو ذيل مربعي الشكل ممتلئ الجسم مع علامات بيضاء مميزة على ريش الذيل، يظهر له تباين واضح بين الجزء السفلي للجناح ذي اللون الأسود اللامع وريش الطيران البني. الخدان لونهما بني ويوجد على الذقن والصدر خطوط رفيعة.
الموائل والمعيشة: يصطاد الحشرات الطائرة بالقرب من المنحدرات والأودية وكذلك فوق أسطح المياه. بطيء الطيران وكثير الانزلاق.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).
.

عوهق جرفي فاتح
Ptyonoprogne obsoleta
(Cabanis, 1850)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر على امتداد شمال أفريقيا إلى باكستان ويقضي الشتاء جنوبي نطاق إقامته.
التوزيع في العلا: يوجد في كل مناطق العلا.
القياسات: الطول: 12-13 سم، المسافة بين الجناحين: 32-34 سم، الوزن: 16-30 جم.
الصفات المميزة: خطاف صغير الحجم يشبه خطاف الجروف الأوراسية ولكن ألوانه باهته والجزء العلوي والعجز يميلان للون الرمادي، الجزء السفلي للجناح باهت اللون وأقل تباينا مع ريش الطيران ومنقط بلون داكن من ناحية الرسغ والخدان أكثر شحوبا والذقن والحلق ذوا لون أبيض مصفر.
الموائل والمعيشة: يصطاد الحشرات الطائرة بالقرب من المنحدرات والأودية وكذلك الأراضي الرطبة. ينزلق عاليا في الهواء وكذلك بالقرب من سطح الأرض، يبحث عن الحشرات فوق قطعان الماشية والمناطق الأخرى الغنية بالحشرات. يعشش في الحروف والمنحدرات وكذلك تحت البنايات الطويلة مثل الجسور.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وإقليميا (LC).

خطاف رملي
Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المهاجرة، يتكاثر في أوراسيا وأمريكا الشمالية يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
التوزيع في العلا: تيماء ووادي نخلة وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 12-13 سم، المسافة بين الجناحين: 26-29 سم، الوزن: 10-20 جم.
الصفات المميزة: خطاف صغير جزؤه العلوي باهت اللون والجزء السفلي أبيض مع حلقة بنية على الصدر مميزة. الجزء السفلي للجناح لونه داكن، الذيل ذو شعبتين بسيطتين بدون نقاط بيضاء.
الموائل والمعيشة: يتغذى على الحشرات الطائرة بالقرب من سطح الأرض أو فوق سطح الماء ويوجد بشكل أساسي في الأراضي الرطبة، سريع الطيران مع خفق بطيء للجناح.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

بلبل أغشى
Pycnonotus leucotis
(Gould, 1836)



التوزيع العالمي: بلبل مقيم، نطاق انتشاره من الجزيرة العربية إلى شمال شرق الهند.
التوزيع في العلا: يوجد في تيماء وجبل الورد وواحات العلا.
القياسات: الطول: 17.5-19 سم، الوزن: 29-35 جم.
الصفات المميزة: بلبل متوسط الحجم، لونه رمادي بشكل عام إلى باهت الرأس والحلق أسودان والخدان أبيضان، الذيل طويل له أطراف بيضاء والريش الكاسي للذيل من الأسفل أصفر اللون.
الموائل والمعيشة: يوجد في جماعات صغيرة وبشكل أساسي حول المناطق الحضرية والريفية ومن ضمنها المزارع والمتنزهات والحدائق. يتغذى على الفواكه والبراعم والرحيق واللافقاريات. يعشش على الأشجار والأحراش.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر إقليميا.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

بلبل أغشى
Pycnonotus leucotis

كعيت
Pycnonotus xanthopygos
(Ehrenberg, 1833)



التوزيع العالمي: يعتبر من الطيور المقيمة ويوجد على امتداد من الجزيرة العربية حتى دول الشام وجنوب تركيا.
التوزيع في العلا: سجل في جميع أنحاء العلا عدا الغراميل وتيماء.
القياسات: الطول: 19 سم، الوزن: 31-46 جم.
الصفات المميزة: بلبل متوسط الحجم يصدر نداءات صاخبة، لونه بني بشكل عام مع رأس أسود أسخم وحلقة العين بيضاء، الذيل طويل وداكن الألون يفتقد اللون الأبيض على أطراف ريشه، الريش الكاسي لقاعدة الذيل من الأسفل (العجز) لونه أصفر.
الموائل والمعيشة: توجد في مجموعات كبيرة قد تتعدى العشرين فرداً. تتغذى على الفواكه والبذور واللافقاريات، تفضل الواحات والأودية والأراضي الشجرية وشبه الصحراوية وكذلك المناطق القريبة من الضواحي مثل الحدائق والمزارع. تبني عشاً كأسي الشكل عاليا في الأشجار والشجيرات.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



كعيت
Pycnonotus xanthopygos

نمنمة ذنوب
Prinia gracilis
(Lichtenstein, 1823)[1]



التوزيع العالمي: مقيم، ينتشر عبر الجزيرة العربية وبلاد الشام ودول وادي النيل والقرن الأفريقي.
التوزيع في العلا: واحات العلا وحرة عويرض وتيماء وخيبر القديمة وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 11-12.5 سم، الوزن: 6.8-8 جم.
الصفات المميزة: طائر صغير جدا لونه بني مائل للرمادي والجزء السفلي باهت والذيل طويل جدا مقارنة بحجمه، ذو ريش متدرج الأطوال. وعادة ما يكون ريشه مفروداً مروحي الشكل. ريش الذيل محدد باللونين الأبيض والأسود. الوجه بني والعيون حمراء. الذكور البالغة في موسم التكاثر لها منقار أسود. نوع نشط ويكثر من إصدار النداءات.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى في الغالب أو في مجموعات صغيرة في الأراضي ذات الغطاء النباتي المنخفض وفي بساتين النخيل والحدائق. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات وأجزاء النبات الخضراء. يعشش في الأحراش المنخفضة.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

نمنمة ذنوب
Prinia gracilis

دخلة شجيرية
Scotocerca inquieta
(Cretzschmar, 1827)[2]



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المقيمة ويوجد في كل من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان.
التوزيع في العلا: يوجد في جميع أنحاء العلا باستثناء تيماء.
القياسات: الطول: 10 سم، الوزن: 6-10 جم.
الصفات المميزة: صغير الجسم بني داكن ذو أرجل طويلة وشريط يمر بالعين أسود دائم والحاجب يميل للون الأبيض والتاج داكن مخطط. الذيل طويل مرفوع داكن الألوان وغالبا ينشره بشكل مروحي. طائر نشط (صوتي) يكثر من إصدار النداءات.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو مجموعات مكونة من أفراد فصيلة واحدة في الأودية الصخرية القاحلة والسهول الخضراء والسهول الرملية ذات الأحراش. يتغذى على اللافقاريات وفي بعض الأحيان على البذور. يبني أعشاشه في النباتات المنخفضة الارتفاعات.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

دخلة شجيرية
Scotocerca inquieta

دخناء أوراسية
Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في نطاق من غرب أوروبا وعبر حوض البحر المتوسط وكازاخستان وفي جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
التوزيع في العلا: تم تسجيله في تيماء والغراميل وواحات العلا.
القياسات: الطول: 12-14 سم، الوزن: 7.5-23.5 جم.
الصفات المميزة: هازجة بلون بني دافئ فاتح ورأس مدبب ومنقار رفيع طويل. الحاجب قصير بلون كريمي مدمج وشريط العين داكن بارز. والجزء الأخير من الظهر ذو لون بني محمر، الذيل مستدير إلى مربع الشكل والريش الذي يكسوه طويل.
الموائل والمعيشة: تتغذى على الحشرات ومفصليات الأرجل في البيئات الرطبة وبشكل خاص القيعان ذات النبات القصبية.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

دخناء زيتونية شرقية
Iduna pallida
(Ehrenberg, 1833)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في شمال أفريقيا ومن غرب أوروبا الى غرب آسيا. يقضي الشتاء في غرب أفريقيا.
التوزيع في العلا: سجل في جميع أنحاء العلا باستثناء وادي نخلة وجبل الورد وجبل نهر.
القياسات: الطول: 12-14 سم، الوزن: 8-16 جم.
الصفات المميزة: تشبه هازجة القصب ولكن لونها العام أدكن وبني زيتوني يميل للرمادي. لها حاجب قصير مميز وشريط العين باهت اللون والبقعة بين العين والجزء العلوي وقاعدة المنقار داكنة اللون. المنقار قوي والفك السفلي عريض بلون وردي.
الموائل والمعيشة: يوجد في الأشجار الكثيفة والسهول الخضراء والحدائق، يتغذى على الحشرات والعناكب وفي بعض الأحيان على الفواكه.
الحالة: مهاجر عابر، مهاجر متكاثر.
الوفرة: غير شائع، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

دخناء أوراسية
Acrocephalus scirpaceus

دخناء زيتونية شرقية
Iduna pallida

دخلة صفصافية
Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر على امتداد غرب أوروبا إلى سيبيريا، يقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
التوزيع في العلا: ينتشر في كلٍ من حرة خيبر ووادي نخلة وحرة الزبن وجبل نهر وحرة عويرض وواحات العلا وجبل الورد.
القياسات: الطول: 12-13 سم، الوزن: 6-15 جم.
الصفات المميزة: نقشارة متوسطة الحجم ذات لون بني زيتوني وحاجب مميز بلون أبيض مائل للأصفر. تشبه النقشارة الشائعة، ولكنها بشكل عام تتميز بنحولة جسمها المستطيل. الأجنحة أطول وزوائد الريش الأولي أكبر. لون الأرجل بني باهت يميل للوردي.
الموائل والمعيشة: يوجد على الأشجار والأحراش وعادة على أشجار الطلحيات وكذلك في الحدائق والمتنزهات. يتغذى على الحشرات وبيضها ويرقاتها بشكل رئيسي وكذلك على العناكب، يأكل البذور والثمار الصغيرة والأجزاء الأخرى من النبات في فصل الخريف.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

دخلة شائعة
Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1817)



التوزيع العالمي: مهاجر، جزئي يتكاثر على امتداد غرب أوروبا إلى بحر قزوين، يقضي الشتاء من جنوب أوروبا إلى شمال أفريقيا والجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في جميع أنحاء العلا.
القياسات: الطول: 11-12 سم، الوزن: 6-12 جم.
الصفات المميزة: نقشارة صغيرة لونها بني زيتوني تشبه نقشارة الصفصاف كثيرا ولكنها أبهت لونا مع حاجب أقصر وأقل اصفرارا. الأرجل بلون أسود وزوائد الريشية الأولى أقصر. لها سلوك مميز، حيث أنها تتحرك بسرعة وترفرف بجناحيها وذيلها عند البحث عن الغذاء.
الموائل والمعيشة: توجد أفراد هذا النوع باحثة عن الغذاء على الأشجار والأحراش وعادة على أشجار الأكاسيا وتوجد في الحدائق والمتنزهات، تتغذى على الحشرات الصغيرة وبيضها ويرقاتها بشكل رئيسي وكذلك على العناكب وأحيانا تأكل البذور والثمار الصغيرة والأجزاء النباتية الأخرى في فصل الخريف.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

نقشارة سيبيرية
Phylloscopus tristis
Blyth, 1843

التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر في سيبيريا ويقضي الشتاء على امتداد جنوب الجزيرة العربية إلى شمال الهند.
التوزيع في العلا: سجل في حرة عويرض.
القياسات: الطول: 11-12 سم، الوزن: 6-12 جم.
الصفات المميزة: نقشارة بلون بني مائل للبرتقالي تشبه النقشارة الشائعة ولكنها أبهت لونا وتفتقد اللون الأصفر عدا على انحناء الجناح وجزء الجناح السفلي. الحاجب بارز بلون أبيض مصفر إلى برتقالي.
الموائل والمعيشة: يوجد في الحدائق والمناطق النباتية ذات الأشجار والشجيرات، نظامها الغذائي غير معروف ويعتقد أنها تشبه بقية النقشارات في غذائها.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

دخلة صفراء حاجب
Phylloscopus inornatus
(Blyth, 1842)

التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر على امتداد روسيا حتى كوريا ويقضي الشتاء في شرق وجنوب شرق آسيا وفي تايوان.
التوزيع في العلا: سُجّل في حرة عويرض وجبل الورد.
القياسات: الطول: 10-11 سم، الوزن: 4-9 جم.
الصفات المميزة: نقشارة صغيرة ونحيلة الجسم والجزء العلوي فاتح اللون أخضر زيتوني، الحاجب أصفر اللون طويل واضح وبارز وعادة ما يوجد لها شريطان بارزان على الجناح وأطراف الريش لونها متباين مع اللون العام وكذلك الحواف متباينة بلون أصفر يميل للأبيض. لون الأرجل يتدرج من بني زيتوني إلى وردي.
الموائل والمعيشة: تتغذى على اللافقاريات الصغيرة في الأراضي الخضراء. قد توجد في المزارع والحدائق والمتنزهات الطبيعية.
الحالة: جوال/متشرد.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).



هازجة مقلنسة أوراسية
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في شمال غرب أفريقيا وعبر أوروبا إلى شمال إيران، يقضي الشتاء حول حوض البحر الأبيض المتوسط وغرب وشرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في كافة أنحاء العلا باستثناء جبل الورد وجبل شيهوب وشرعان وجبل نهر.
القياسات: الطول: 13.5-15، الوزن: 8.5-31 جم.
الصفات المميزة: طائر متوسط الحجم ضخم البنية ذو قلنسوة صغيرة سوداء في الذكور وبلون بني في الإناث. يفتقد اللون الأبيض على ريش الذيل الخارجي. المنقار والأرجل ذات لون رمادي.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في مجموعات صغيرة في الأراضي الخضراء مثل المتنزهات والحدائق وأيضا في الأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف. يتغذى على الفواكه والثمار والحشرات ويبحث عن الغذاء بشكل رئيسي على الأشجار.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

هازجة حدائقيةr
Sylvia borin
(Boddaert, 1783)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، حيث يتكاثر على امتداد أوروبا إلى كازاخستان ويقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.
التوزيع في العلا: سُجّل في حرة خيبر والغراميل.
القياسات: الطول: 13-14.5 سم، الوزن: 16-22 جم.
الصفات المميزة: دخلة متوسطة الحجم لونها بني رمادي بدون نقوش واضحة لونها يميل للرمادي الخفيف على جوانب الرقبة والمنقار سميك لونه رمادي يميل للأزرق. الأرجل قوية لونها رمادي وتفتقر إلى اللون الأبيض على الريش الخارجي للذيل.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في أزواج في المناطق ذات الغطاء النباتي والأحراش الكثيفة. يبحث عن الغذاء بين النباتات ويأكل الحشرات بشكل رئيسي والثمار الصغيرة وحبوب اللقاح والرحيق بشكل ثانوي.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

هازجة صحراوية آسيوية
Curruca nana
Ehrenberg, 1833



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، نطاق تكاثره يمتد من أواسط إلى غرب آسيا، يقضي الشتاء على سواحل البحر الأحمر وعبر الجزيرة العربية إلى شمال غرب الهند.
التوزيع في العلا: يوجد في وادي نخلة وجبل نهر والغراميل ومحمية شرعان وحرة الزبن.
القياسات: الطول: 11.5-12.5 سم، الوزن: 7-11 جم.
الصفات المميزة: دخلة صغيرة لونها بني باهت، والذيل والجزء الأخير من الظهر وصف الريش الثالثي للجناح القريب من الظهر بني محمر، وعروق الريش الوسطى للذيل لونها داكن والريش الخارجي ذو أطراف بيضاء مما يعطي مظهراً ثلاثي الألوان. المنقار رفيع لونه فاتح وحلقة ماحول العين باهتة اللون وقزحية العين لونها يميل للأصفر.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في مجموعات صغيرة تتبع طيور الأبلق في المناطق القاحلة ذات الغطاء النباتي المتناثر من الصحاري والأراضي شبه الصحراوية وجوانب التلال والسهول. يتغذى على الحشرات والبذور والثمار البرية الصغيرة حيث يلتقطها من على سطح الأرض أو قريباً منه.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

هازجة عربية
Curruca leucomelaena
Ehrenberg, 1833



التوزيع العالمي: هازجة مقيمة، تنتشر حول البحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية ودول القرن الأفريقي.
التوزيع في العلا: سُجّلت في واحات العلا وجبل شيهوب وحرة الزبن وجبل الورد وحرة عويرض وكذلك في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 14.5-16 سم، الوزن: 11-16.5 جم.
الصفات المميزة: هازجة كبيرة قوية البنية ذات لون رمادي يميل للبني ورأسها أسود والحلق أبيض والجزء السفلي باهت. لها ذيل أسود طويل وحدود ريشه باهتة وأطرافها بيضاء. قزحية العين والأرجل داكنة الألوان. تتميز الأنثى بألوان باهتة عن الذكور.
الموائل والمعيشة: في الغالب تتغذى في أزواج على الحشرات ومفصليات الأرجل الأخرى ولكن تأكل الثمار الصغيرة أيضا. توجد في المناطق الجرداء كثيفة أشجار الأكاسيا مثل الأراضي شبه الصحراوية والأودية. تبني أعشاشا كأسية في الأحراش الكثيفة وفي الأشجار.
الحالة: مقيمة.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

زوراء صغيرة
Curruca curruca
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: دخلة مهاجرة، نطاق تكاثرها يمتد من شرق أوروبا إلى شرق آسيا. تقضي الشتاء من الصحراء الكبري امتداد إلى جنوب آسيا.
التوزيع في العلا: توجد في جميع مناطق العلا باستثناء جبل الورد.
القياسات: الطول: 12.5-14 سم، الوزن: 9.5-18 جم.
الصفات المميزة: دخلة صغيرة لونها بني مائل للرمادي ولها تاج رمادي والريش المغطي للأذن داكن والحلق أبيض متباين ضد الصدر الأبيض الكريمي. الأرجل والذيل داكنة اللون وريش الذيل ذو أطراف بيضاء.
الموائل والمعيشة: يوجد في جماعات صغيرة في الأراضي المغطاة بالنبات وذات الأشجارالمتميزة بكثافة الغطاء النباتي تحتها عادة من أنواع الأكاسيا والطرفاء والأثل. يتغذى على الحشرات وغيرها من مفصليات الأرجل، يوجد بين النباتات وفي بعض الأحيان على الأرض.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

هازجة رأساء
Curruca mystacea
(Ménétries, 1832)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة ذات نطاق تكاثر يمتد من غرب تركيا وبلاد الشام إلى آسيا وتقضي الشتاء من شمال شرق أفريقيا إلى جنوب إيران.
التوزيع في العلا: سجلت في جميع أنحاء العلا باستثناء واحات العلا وجبل الورد وخيبر القديمة.
القياسات: الطول: 12-13 سم، الوزن: 7-11.5 جم.
الصفات المميزة: دخلة صغيرة تشبه الهازجة السردينية ولكنها أقصر ذيلا وصف ريش الجناح الثالث أسود والأرجل تميل للون الوردي. المنقار داكن ذو قاعدة وردية. للذكر قلنسوة داكنة تميل للأسود وكذلك غطاء الأذن الذي يتدرج إلى اللون الرمادي البني الملون للجزء العلوي، لها شريط يشبه الشارب بلون فاتح يتباين ضد الجزء السفلي وحلقة ما حول العين المائلة للون الوردي. رأس الأنثى رملي إلى بني سائد يمتد للظهر. الجزء السفلي كريمي اللون وحلقة ما حول العين تميل للبياض.
الموائل والمعيشة: هادئة ولكنها ترفرف بذيلها بتواتر خلال بحثها عن الغذاء وتقتات على مفصليات الأرجل والفواكه والثمار الصغيرة وتبحث عنها بين النباتات أو على الأرض، توجد في أزواج في السهول ذات النبات القصيرة.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

هازجة سردينية
Curruca melanocephala
(Gmelin, 1789)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في حوض البحر المتوسط ويقضي الشتاء في شمال أفريقيا وغرب الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: سُجّل هذا النوع في حرة عويرض والغراميل ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 13-14 سم، الوزن: 12-25 جم.
الصفات المميزة: دخلة متوسطة الحجم وكبيرة الرأس، لون الحلق أبيض وحلقة ما حول العين حمراء، لها ذيل طويل بأطراف بيضاء لريش الذيل. الأرجل بنية اللون والمنقار داكن وتميل للون الأزرق عند قاعدة المنقار السفلي. الذكور لها رأس بلون أسود لامع يتباين مع قاعدة المنقار السفلي والجوانب ذات اللون الرمادي. لون رأس الأنثى رمادي والجزء السفلي بني داكن والجوانب لونها كريمي.
الموائل والمعيشة: تتغذى فرادى أو في مجموعات صغيرة، تبحث عن اللافقاريات والفواكه والثمار الصغيرة في السهول الجافة والخضراء المفتوحة ذات الأشجار القصيرة وفي الأودية والحدائق والمناطق الزراعية.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

هازجة مغردة شرقية
Curruca cantillans
(Pallas, 1764)



التوزيع العالمي: دخلة مهاجرة تتكاثر في حوض البحر المتوسط وتقضي الشتاء في الصحراء الكبرى بأفريقيا.
التوزيع في العلا: توجد في واحات العلا وجبل نهر ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 12-13.5 سم، الوزن: 7-16 جم.
الصفات المميزة: دخلة صغيرة ذات أرجل رفيعة تميل للون الأصفر، المنقار رفيع ولها شريط بارز يشبه الشارب أبيض اللون. الذيل داكن قصير وأطراف ريشه بيضاء. الرأس والجزء العلوي للذكور لونها رمادي مائل للأزرق والحلق والصدر لونها أحمر يميل للون القرميد وحلقة ما حول العين حمراء. ألوان الأنثى شاحبة والجزء العلوي يميل للبني بدرجة كبيرة والرأس بني مائل للرمادي وحلقة ما حول العين باهتة من الحدود الداخلية والداخلية لونها أحمر.
الموائل والمعيشة: توجد فرادى أو في مجموعات صغيرة في السهول ذات النباتات الشائكة والأحراش الكثيفة. تبحث عن الغذاء بين النباتات وترفرف بجناحيها وتنصب ذيلها وهي تلتقط اللافقاريات والثمار البرية الصغيرة والبذور.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

زوراء شائعة
Curruca communis
(Latham, 1787)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، نطاق تكاثره يمتد من أوروبا وشمال شرق أفريقيا إلى منغوليا ويقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.
التوزيع في العلا: تم تسجيله في وادي نخلة وخيبر القديمة وحرة خيبر.

القياسات: الطول: 13-15 سم، الوزن: 14-17 جم.
الصفات المميزة: دخلة صغيرة الحجم قوية البنية، جزؤها العلوي لونه رمادي إلى بني زيتوني، والحلق أبيض يتباين مع الصدر الذي يميل للون الوردي. تشبه دخلة بيضاء الحلق الصغيرة ولكن أطراف ريش أجنحتها لونها بني محمر والأرجل لونها بني مصفر ناصع والريش المغطى للأذن فاتح اللون. الذيل طويل وداكن اللون وأطراف ريش الذيل بيضاء. الأنثى ذات لون عام أبهت من الذكور ويسود اللون البني على الرأس والوجه.
الموائل والمعيشة: يوجد في الأراضي المفتوحة ذات الأحراش المتناثرة والأراضي ذات أشجار الأكاسيا أو بالقرب من الأراضي الرطبة والحدائق والسياج الشجرية. يتغذى بشكل رئيسي بين الأحراش على الحشرات والفواكه والثمار البرية الصغيرة ويتغذى على الأرض أيضا وتطارد الحشرات الطائرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

♂

هازجة مقلنسة أوراسية
Sylvia atricapilla

هازجة صحراوية آسيوية
Curruca nana

هازجة حدائقية
Sylvia borin

هازجة عربية
Curruca leucomelaena

زوراء صغيرة
Curruca curruca

هازجة رأساء
Curruca mystacea



♂

♂

هازجة سردينية
Curruca melanocephala

هازجة مغردة شرقية
Curruca cantillans

♂

♂

زوراء شائعة
Curruca communis

بلنصي عربي
Argya squamiceps
(Cretzschmar, 1827)[1]



التوزيع العالمي: مقيم وأصيل لحد كبير للجزيرة العربية، ينتشر في جنوب الجزيرة العربية وغربها ويصل انتشاره إلى بلاد الشام.
التوزيع في العلا: يوجد في كل مناطق العلا باستثناء تيماء.
القياسات: الطول: 26-29 سم، الوزن: 64-83 جم.
الصفات المميزة: طائر كبير ذو ذيل طويل، بني اللون، مع خطوط خفيفة تمتد من الرأس إلى الكتف والصدر. الأرجل صفراء اللون والمنقار داكن ذو قاعدة مصفرة.
الموائل والمعيشة: يعيش بشكل اجتماعي مكونا مجموعات كبيرة في السهول الجافة والأودية والأراضي ذات أشجار الأكاسيا وبالقرب من مصادر المياه. يبحث عن الغذاء على الأرض ويتغذى على اللافقاريات ومن ضمنها الحشرات والعناكب والعقارب وأيضا على السحالي والثعابين والأجزاء النباتية تتنقل الأفراد بشكل واضح مصدرة نداءات مستمرة للتواصل مع أفراد مجموعتها.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

ضوعة
Onychognathus tristramii
(Sclater, 1858)[2]



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المقيمة والقريبة من أن تكون أصيلة للجزيرة العربية، ينتشر في جنوب الجزيرة العربية وغربها ويصل انتشاره إلى بلاد الشام.
التوزيع في العلا: سجل في كل مناطق العلا باستثناء حرة خيبر وتيماء.
القياسات: الطول: 25 سم، الوزن: 115-131 جم.
الصفات المميزة: زرزور كبير لونه أسود لامع وريش الطيران الأولي لونه بني محمر يميل للبرتقالي، للأنثى رأس رمادي اللون مع خطوط على قفا الرأس والرقبة تمتد للصدر.
الموائل والمعيشة: توجد في مجموعات صغيرة من نفس الفصيلة أو أسراب صاخبة كبيرة تضم عشرات الأفراد، في التلال الصخرية، والصحارى، وبالقرب من المزارع أو المناطق الحضرية. تتغذى على الفواكه بشكل عام وعلى اللافقريات ولكنها تأكل بقايا الطعام من مخلفات البشر أيضا.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

ماينا شائع
Acridotheres tristis
(Linnaeus, 1766)

التوزيع العالمي: مقيم، متوطن للجزء الجنوبي من قارة آسيا ويعتبر نوعا مدخلا في جميع أنحاء العالم ومن أفريقيا مرورا بالجزيرة العربية إلى أستراليا.
التوزيع في العلا: سجل في خيبر القديمة.
القياسات: الطول: 23-26 سم، الوزن: 82-143.
الصفات المميزة: طائر اجتماعي جريء ذو لون بني قاتم مع رأس أسود لامع والأرجل والمنقار لونها أصفر فاتح كما أن له رقعة تحت العين لونها أصفر فاتح، له نقوش بيضاء على الصف الأول لريش الطيران وكذلك على الريش الخارجي للذيل في حال الطيران.
الموائل والمعيشة: يتغذى على الأرض على اللافقاريات والفقاريات الصغيرة وعلى البذور والفواكه وبقايا الطعام من مخلفات البشر. يوجد فرادى أو مجموعات صغيرة على السواحل وداخل المناطق المأهولة مثل الحدائق والمتنزهات وعلى جوانب الطرق. يعشش في الفجوات ومنها فجوات البنايات.
الحالة: مقيم (مدخل).
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.



سمنة مغردة
Turdus philomelos
Brehm, 1831

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، نطاق تكاثره يمتد من غرب أوروبا إلى منغوليا، يقضي الشتاء حول حوض البحر المتوسط وعلى امتداد من شمال شرق أفريقيا إلى إيران.
التوزيع في العلا: يوجد خارج المناطق المحمية بين شرعان ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 20-23 سم، الوزن: 50-107 جم.
الصفات المميزة: سمنة ممتلئة الجسم بذيل قصير والجزء العلوي لونه بني باهت، الجزء السفلي أبيض مع نقاط سوداء منتظمة والجوانب الخلفية وعادة ما يكون ريش الصدر منفوشا، تميل الأرجل للون الوردي، والمنقار داكن وقاعدته فاتحة اللون والريش الكاسي للجناح بني محمر يمكن رؤيته خلال الطيران.
الموائل والمعيشة: توجد في الأحراش الكثيفة ذات النباتات القصيرة تحتها، تتغذى على الأرض بين أوراق النباتات المتساقطة بحثا عن اللافقاريات والثمار الصغيرة والفواكه وفي بعض الأحيان على الفقاريات الصغيرة. سلوكها مميز حيث تقوم بفتح صدفة الحلزونات باستخدام الصخور تاركة آثاره من الأصداف المكسورة.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

شوالة
Cercotrichas galactotes
(Temminck, 1820)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في الصحراء الكبرى امتدادا عبر دول الساحل إلى القرن الأفريقي وحوض البحر المتوسط. يقضي الشتاء في نطاق إقامته الجنوبي.
التوزيع في العلا: تيماء وخيبر القديمة.
القياسات: الطول: 15-17 سم، الوزن: 20-28 جم.
الصفات المميزة: يشبه العندليب كثيرا في الشكل والحجم ولكن الجزء الآخر للظهر مع الذيل لونه أحمر وأطراف ريش الذيل لونها أبيض وأسود، للطائر نقوش واضحة على الوجه ومن ضمنها الحاجب الأبيض وشريط أسود يمر بالعين.
الموائل والمعيشة: يتكاثر في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف ومن ضمنها بساتين النخيل والمزارع، كما يوجد في المناطق الجافة في موسم الهجرة. يتغذى على اللافقاريات حيث يبحث عنها على الأرض ويتغذى على البذور والثمار الصغيرة من حين لآخر.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سوادية
Cercotrichas podobe
(Müller, 1776)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، نطاق التكاثر يمتد من الساحل الأفريقي وجنوب وغرب الجزيرة العربية وفلسطين. يقضي الشتاء في شرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا وخيبر القديمة وتيماء وكلٍ من حرة عويرض والزبن.
القياسات: الطول: 18-20 سم، الوزن: 24-27 جم.
الصفات المميزة: طائر مميز بلونه الأسود، متوسط الحجم ذو ذيل طويل وأطراف ريش الذيل بيضاء وعادة ما يكون الذيل مرفوعا ومفرود الريش.
الموائل والمعيشة: طائر واضح للعيان يوجد في السهول الجافة والأودية كثيفة الغطاء النباتي ويوجد بشكل شائع في الواحات والمزارع. يتغذى على الأرض على اللافقاريات وعادة ما تصدر أفراد هذا النوع نداءات وهي جاثمة في مواقع مكشوفة.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



صائد ذباب أرقط
Muscicapa striata
(Pallas, 1764)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، ويتكاثر في نطاق يبدأ من شمال أفريقيا وغرب أوروبا وصولا إلى منغوليا. يقضي الشتاء في جنوب الصحراء العظمى في أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة خيبر ووادي نخلة وخيبر القديمة وحرة عويرض.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 11-22 جم.
الصفات المميزة: خطاف ذباب لونه العام رمادي مائل للبني والأجنحة طويلة وله خطوط على الجبهة تمتد إلى القفا ومن الحلق حتى الصدر والجانبين الأماميين. المنقار طويل وداكن والأرجل سوداء قصيرة.
الموائل والمعيشة: يوجد في السهول الخضراء المفتوحة والمتنزهات الطبيعية والحدائق، عادة ما يكون جاثما في مواقع مكشوفة على الأشجار والشجيرات الطويلة يقف مستطيل الجسم بحثا عن فرائسه. رشيق وسريع الطيران مما يساعده على افتراس على الحشرات الطائرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

زرقاء زور
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر على امتداد شمال أوراسيا إلى ألاسكا. يقضي الشتاء في نطاق من الساحل الأفريقي إلى جنوب آسيا وحوض البحر المتوسط.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا وتيماء.
القياسات: الطول: 13-15 سم، الوزن: 12-25 جم.
الصفات المميزة: متوسط الحجم يشبه السمنة ذو أرجل طويلة. الحاجب أبيض وقاعده الذيل والريش الخارجية له بلون محمر وعليه حلقة طرفية سوداء. الذكور البالغة في موسم التكاثر لها حلق وصدر زرقاء واضحة بينما يكون اللون الأزق متغايرا وأخف في الإناث والذكور غير البالغة.
الموائل والمعيشة: يوجد في الأراضي الرطبة ذات النباتات القطبية والأراضي الرطبة الأخرى. يتغذى على اللافقاريات بشكل رئيسي على الفواكه والبذور أحيانا حيث يبحث عنها على الارض.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

عندليب
Luscinia luscinia
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: نوع مهاجر، نطاق تكاثره يمتد من شمال أوروبا إلى غرب وأواسط آسيا ويقضي الشتاء في الجنوب الشرقي لقارة أفريقيا.
التوزيع في العلا: سجل في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 16-17 سم، الوزن: 14-37 جم.
الصفات المميزة: طائر هادئ ومنعزل جدا ذو حجم متوسط ولون زيتوني بني يشبه السمنة وله ذيل بني مائل للأحمر والصدر ذو خطوط ممووجة مدمجة وحلقة ما حول العين والحلق لونها مائل للأبيض.
الموائل والمعيشة: يوجد في البيئات كثيفة الغطاء النباتي من السهول والأحراش وعادة ما يوجد قرب مصادر المياه. يبحث عن غذائه من اللافقاريات على الأرض بين أوراق النباتات المتساقطة، يتغذى أيضا أيضا على الفواكه والثمار البرية الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

صائد ذباب أرقط
Muscicapa striata

زرقاء زور
Luscinia svecica

عندليب
Luscinia luscinia

حميراء سوداء
Phoenicurus ochruros
(Gmelin, 1774)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، نطاق تكاثره يبدأ من غرب أوروبا وغرب أفريقيا إلى الصين. يقضي الشتاء على امتداد من جنوب أوروبا وشمال أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا وحرة عويرض ومحمية شرعان ووادي نخلة والغراميل.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 12-20 جم.
الصفات المميزة: من الطيور الجاثمة متوسطة الحجم ذو ذيل مميز بلون بني محمر يشبه الحميراء ولكن الجزء العلوي في الذكور أدكن واللون الأسود على الجزء السفلي أكثر من الحميراء والبطن والريش الكاسي للذيل مصفر وتفتقد الذكور للون الأبيض الناصع على الجبهة. الجزء العلوي والبطن في الإناث لونه يميل للرمادي والريش الكاسي للذيل مصفر.
الموائل والمعيشة: واسع الانتشار يوجد في بيئات متعددة من الأودية الصخرية والبيئات ذات الغطاء النباتي الأخرى مثل الحدائق والمناطق الزراعية. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات حيث يصطادها من على الأرض.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

حميراء شائعة
Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر، نطاق تكاثره يمتد من غرب أوروبا وشمال أفريقيا إلى آسيا. يقضي الشتاء على امتداد من غرب أفريقيا إلى جنوب الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: محمية شرعان ووادي نخلة وخيبر القديمة وحرة خيبر وحرة عويرض وواحات العلا.
القياسات: الطول: 13-15 سم، الوزن: 11-23 جم.
الصفات المميزة: جاثم متوسط الحجم رفيع الجسم ذو ذيل مميز حيث الريش الخارجي له لونه أحمر بني زاهي وريش منتصف الذيل أسود. الجزء العلوي في الذكور يميل للرمادي والرأس والحلق سوداء مع جبهة بيضاء والصدر والبطن برتقالي. الأنثى أكثر شحوبا من الذكر والجزء العلوي والوجه بني سائد وحلقة ما حول العين بيضاء باهتة والجزء السفلي أبيض مصفر.
الموائل والمعيشة: يوجد جاثما على الأشجار والشجيرات في الحدائق والمزارع والواحات والأودية وكذلك في السهول الخضراء ينزل إلى الأرض لفترة قصيرة لاصطياد اللافقاريات التي يأكلها وهو جاثم.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

سمنة صخرية زرقاء
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، نطاق تكاثره يمتد من شمال أفريقيا وغرب أوروبا حتى شرق آسيا. يقضي الشتاء على امتداد من شرق أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.
التوزيع في العلا: سجل في وادي نخلة وحرة عويرض والغراميل ومحمية شرعان.
القياسات: الطول: 20-23 سم، الوزن: 37-70 جم.
الصفات المميزة: خطاف ذباب كبير أزرق يشبه السمنة ذو منقار وذيل طويلة. الذكر شاحب الألوان مع أجنحة سوداء والأنثى لونها بني داكن مع خطوط مموجة للجزء السفلي ولون أزرق خفيف على الجزء العلوي.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في مجموعات صغيرة في الصحاري الصخرية. ينقض على فرائسه من مجثم مرتفع ويصطاد اللافقاريات والفقاريات الصغيرة ويلتقط فرائسه من على النباتات وكذلك في حال الطيران. يتغذى على البذور والفواكه أيضا.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



برقش أحمر
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر من أوروبا إلى غرب سيبيريا ويقضي الشتاء من غرب إلى شرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة خيبر.
القياسات: الطول: 12-14 سم، الوزن: 13-26 جم.
الصفات المميزة: يتميز هذا النوع بوقفة مستقيمة وذيل قصير والأرجل سوداء والجوانب بيضاء اللون وتمتد حتى قاعدة الذيل. للذكر خطوط تظهر بشكل بارز تميل للسواد على الوجه، والحاجب أبيض اللون وله شريط ضيق أبيض اللون بين الخدود المائلة للسواد والصدر برتقالي اللون. لون الصدر في الأنثى أبهت والخدود لونها بني ودائما ما يكون ريش الحاجب منفوشا.
الموائل والمعيشة: يوجد في المناطق المفتوحة قليلة الأحراش ويجثم في قمم ما يجثم عليه لاكتشاف الحشرات الطائرة الصغيرة التي يتغذى عليها.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

برقش
Saxicola torquatus
(Linnaeus, 1766)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ومن شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا إلى جنوب شرق آسيا ومن ضمنها الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: سجل هذا النوع في كل من الغراميل ووادي نخلة وتيماء وحرة عويرض ومحمية شرعان وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 13 سم، الوزن: 13-17 جم.
الصفات المميزة: برقش قصير الذيل يشبه القليعي الأحمر ولكن رأسه كبير وأكثر استدارة وليس له حاجبان. للذكور رأس وصدر سوداء وبقع بيضاء على الحلق وبرتقالية على البطن والجناحان أسودان وعلى كل منهما شريط كبير أبيض. الإناث باهتة اللون وريش الجزء العلوي لها مخطط والرأس والصدر بني قاتم والجزء العلوي للصدر برتقالي يميل للأحمر.
الموائل والمعيشة: يوجد في البيئات المفتوحة الرطبة كالحدائق والمزارع. يبحث عن الغذاء على الأرض ويقتات على اللافقاريات بشكل رئيسي وكذلك البذور ومن حين لآخر يصطاد الفقاريات الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق أسود الذنب
Oenanthe melanura
(Temminck, 1824)

برقش أحمر
Saxicola rubetra



برقش
Saxicola torquatus

التوزيع العالمي: مقيم، نطاق إقامته من دول الساحل الأفريقي إلى سواحل البحر الأحمر والقرن الأفريقي ومصر وغرب الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في كل مناطق العلا باستثناء الغراميل وتيماء.
القياسات: الطول:14 سم، الوزن: 13-18 سم.
الصفات المميزة: طائر صغير ونحيل ذو لون رمادي وذيل مميز أسود عادة ما يكون منخفضا مفرود الريش.
الموائل والمعيشة: يوجد على الأشجار في العادة في الأودية والمناطق الصخرية الجافة ذات الأحراش وأشجار الأكاسيا. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات حيث يصطادها من على الأرض أو في حال الطيران. يعيش في الجحور والفجوات بين الصخور.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق أسود الذنب
Oenanthe melanura

أبلق شمالي
Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، يتكاثر في أوراسيا حتى الأرض الخضراء (جزيرة تقع بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي) وألاسكا وكندا. يقضي الشتاء في الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: سجل في وادي نخلة والغراميل وحرة خيبر ومحمية شرعان.
القياسات: الطول: 14.5-15.5 سم، الوزن: 18-33 جم.
الصفات المميزة: أبلق متوسط الحجم ذو أرجل طويلة وأجنحة قصيرة نسبيا. يظهر في الذكور البالغة في موسم التكاثر قلنسوة رمادية وحاجب رمادي وقناع أسود وحلق برتقالي اللون والأجنحة داكنة اللون. ألوانها في فصل الخريف تكون شاحبة مع لون أسود مائل للبني. لون الأنثى مائل للبني وهو أقل تباينا والحاجب أكثر شحوبا وليس لها قناع أسود. الذيل والجزء الأخير للظهر أبيضان وحلقة الذيل الطرفية سوداء (أدق من تلك الموجودة في الأبلق الدرجي) وخط منتصف الذيل أسود على شكل حرف "T".
الموائل والمعيشة: يوجد في موسم الهجرة في المناطق المفتوحة الصخرية والحصوية والأراضي ذات الغطاء النباتي المتناثر والحقول المحصودة. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات حيث يصطادها من على الأرض ويتغذى في بعض الأحيان على الثمار البرية الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق درجي
Oenanthe isabellina
(Temminck, 1829)



التوزيع العالمي: نوع مهاجر، نطاق تكاثره يمتد من بلغاريا إلى منغوليا، يقضي الشتاء على امتداد دول الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا والجزيرة العربية إلى شمال غرب الهند.
التوزيع في العلا: سجل في الغراميل ووادي نخلة وكل من حرة عويرض وخيبر والزبن ومحمية شرعان وجبل نهر.
القياسات: الطول: 16-17 سم، الوزن: 21-39 جم.
الصفات المميزة: أبلق رملي شاحب كبير ذو أرجل طويلة ويقف منتصبا بشكل مستقيم. الأجنحة بنية شاحبة تتباين مع اللون الأسود. الحاجب أكثر بياضًا أمام العين (على العكس من الأبلق الشمالي). البقعة بين العين والمنقار سوداء عند الذكر، وبنية عند الأنثى. الذيل أبيض اللون مع شريط طرفي عريض أسود وخط مركزي (على شكل حرف "T").
الموائل والمعيشة: يوجد في البيئات شبه الصحراوية والسهول والجبال الجرداء والحقول الزراعية. يتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات حيث يهبط على فرائسه من مجثم.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق كردي
Oenanthe xanthoprymna
(Hemprich & Ehrenberg, 1833)



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر ابتداء من جنوب شرق تركيا إلى جنوب شرق إيران ويقضي الشتاء في شرق مصر على امتداد نهر النيل والصحراء الغربية.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة الزبن وجبل نهر وجبل الورد.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 18-29 جم.
الصفات المميزة: أبلق متوسط الحجم ذو منقار طويل ورفيع. للذكور حاجب أبيض وأعلى الصدر أسود اللون ويتصل بالأجنحة السوداء، الجزء العلوي رمادي والعجز ونهاية الظهر العلوية لونها أحمر بني يميل للبرتقالي. الذيل أبيض مع شريط أسود طرفي والريش الوسطي للذيل أسود.
الموائل والمعيشة: يوجد في الصحاري الصخرية والتلال والحقول الحجرية والأودية الصخرية. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات وفي بعض الأحيان على السحالي والبذور والثمار الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: نادر، نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق أبيض قنة
Oenanthe leucopyga
(Brehm, 1855)



التوزيع العالمي: من أنواع الطيور المقيمة، ينتشر من الشمال الأفريقي إلى غرب الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في كل مناطق العلا باستثناء تيماء.
القياسات: الطول: 17 سم، الوزن: 23-39 جم.
الصفات المميزة: أبلق كبير سائد السواد بأرجل طويلة ومستقيم الوقفة. نهاية الظهر العلوية قبل الذيل بيضاء، والذيل والريش المنصف للذيل سوداء. للأفراد البالغة قلنسوة بيضاء.
الموائل والمعيشة: يوجد في البيئات الجافة مثل الصحاري الصخرية والمنحدرات الحجرية والجروف والأودية الجافة وحقول الصهارة البركانية وعادة ما يوجد بالقرب من المواطن السكنية. يتغذى على اللافقاريات حيث يسقط على فرائسه من مجثم. يأكل السحالي والبذور والثمار البرية الصغيرة في بعض الأحيان. يعشش في الشقوق بين الصخور.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق مقلنس
Oenanthe monacha
(Temminck, 1825)



التوزيع العالمي: أبلق مقيم، ينتشر من شرق مصر حتى جنوب غرب باكستان ويوجد بشكل متناثر في الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة الزبن وحرة خيبر وحرة عويرض وجبل نهر والغراميل وشرعان.
القياسات: الطول: 18 سم، الوزن: 18-23 جم.
الصفات المميزة: أبلق كبير ونحيل المنقار والأجنحة والذيل رفيعة وطويلة والأرجل قصيرة، عادة ما يكون في وضع الجلوس أو رابض. الذكور البالغة لونها أبيض وأسود والقلنسوة والجزء السفلي أبيض ويمتد اللون الأبيض حتى منتصف الصدر، الذيل ومؤخرة الظه بيضاء والريش المنصف للذيل أسود. الأنثى شاحبة لونها بني رمادي مع أجنحة داكنة والذيل مع آخر الظهر لونها بني محمر.
الموائل والمعيشة: يوجد في المناطق المنعزلة مثل الأودية الصحراوية والأودية الصخرية والشقوق الضيقة وجوانب التلال الجرداء وبطون الأودية والأنهار الجافة، وغالبا ما تحتوي هذه البيئات على الأحجار الكبيرة. ويوجد هذا النوع في بيئات أكثر قساوة من البيئات التي توجد فيها الأنواع الأخرى. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات وغالبا ما يقتات على الحشرات الطائرة حيث يطاردها في الهواء لفترات طويلة. يعشش في الشقوق الصخرية.
الحالة: مقيم.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق حزين شرقي
Oenanthe lugens
(Lichtenstein, 1823)



التوزيع العالمي: أبلق مهاجر جزئي، يتكاثر في شمال وغرب أفريقيا ومن الجزيرة العربية إلى سوريا وإيران، يقضي الشتاء في الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا باستثناء حرة خيبر وخيبر القديمة وتيماء.
القياسات: الطول: 14-16 سم، الوزن: 19-25 جم
الصفات المميزة: أبلق لونه أبيض وأسود والريش الكاسي للذيل لونه أحمر بني. الجزء السفلي أبيض يمتد للحلق الأسود والتاج الأبيض. في حال الطيران يظهر شريط عريض أبيض اللون على ريش الطيران، للذيل حلقة منتظمة سوداء مع الخط المنصف للذيل بلون أسود.
الموائل والمعيشة: يوجد في المنحدرات القاحلة والمنحدرات ذات الأحجار الرملية والبيئات شبه الصحراوية ذات الصخور البارزة. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات حيث يمسك بها على الأرض أو في الهواء. يعشش في الشقوق بين الصخور.
الحالة: مقيم، زائر شتوي.
الوفرة: غير شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق صحراوي
Oenanthe deserti
(Temminck, 1825)



التوزيع العالمي: أبلق مهاجر، يتكاثر ابتداءً من شمال غرب أفريقيا إلى منغوليا ويقضي الشتاء في الساحل الأفريقي والجزيرة العربية إلى شمال غرب الهند.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة الزبن وحرة عويرض وجبل نهر ووادي نخلة وحرة خيبر والغراميل وشرعان.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 15-34 جم.
الصفات المميزة: أبلق ممتلئ الجسم قصير الرقبة والذيل، اللون العام رملي. الذكر يتميز بوجه وأجنحة سوداء اللون متصلة عند الحلق مقارنة بالأبلق أسود الأذن، والحاجب ووشاح الكتف بيضاء. لون الأنثى رملي شاحب وتفتقد لون الأسود على الوجه وذيلها أسود يتباين مع نهاية الظهر العلوية البيضاء. يرفرف بالذيل بشكل مستمر.
الموائل والمعيشة: يفضل هذا النوع البيئات المفتوحة مثل السهول الصحراوية والمناطق الصخرية الجرداء وحقول الصهارة البركانية. تتغذى أفراد هذا النوع على اللافقاريات حيث تصطادها من على الأرض وتقتات على البذور أحيانا.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق أغشى شرقي
Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: أبلق مهاجر، يتكاثر في حوض البحر المتوسط امتدادا إلى إيران ويقضي الشتاء في الساحل الأفريقي. النويع المسجل في المنطقة هو الأبلق أسود الإذن الغربي (*O. h. melanoleuca*).
التوزيع في العلا: سُجل في الغراميل وحرة خيبر.
القياسات: الطول: 13.5-15.5 سم، الوزن: 12-21 جم.
الصفات المميزة: أبلق صغير ونحيل الجسم طويل الذيل. الذكور البالغة ذات لون يميل للون الأبيض والبني المائل للبرتقالي والقناع والأجنحة سوداء (اللون الأسود للجناح غير متصل مع الحلق). الصدر يظهر إما بلون باهت أو أسود. الأنثى والأفراد غير البالغة تظهر بلون بني يميل للرمادي للجزء السفلي بنفس نمط ألوان ونقوش الذكور ولكن باهتة. الجزء الأخير للظهر مع الذيل بيضاء والريش المنصف للذيل أسود والشريط الطرفي على الذيل أسود ولكن غير منتظم حيث يكون أعرض عند حدي الذيل.
الموائل والمعيشة: يوجد في الأراضي المكشوفة والمتناثرة النباتات والمتنزهات الكبيرة. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات ويسقط عليها من مجثم مرتفع. يقتات في بعض الأحيان على البذور والثمار البرية الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

أبلق أبقع
Oenanthe pleschanka
(Lepechin, 1770)

التوزيع العالمي: أبلق مهاجر، يتكاثر على امتداد من شرق رومانيا إلى شمال الصين، يقضي الشتاء في جنوب غرب الجزيرة العربية وشرق أفريقيا.

التوزيع في العلا: يوجد في حرة خيبر.
القياسات: 14.5-16 سم، الوزن: 16-22 جم.
الصفات المميزة: أبلق نحيل الجسم طويل الذيل يشبه الأبلق أسود الأذن كثيرا وله نفس نمط الذيل. الذكر ذو حلق أسود أو باهت ولكن ظهره أسود اللون واللون الأسود على الوجه متصل بالجناح. والأنثى كثيرة الشبه بأنثى الأبلق أسود الأذن ولكن أدكن لونا.
الموائل والمعيشة: يوجد في البيئات شبه الصحراوية الصخرية الجرداء والمعزولة والحقول الحجرية والأودية الصخرية وكذلك في الأراضي الخضراء مثل السهول والمزارع وحقول الري المحوري. يتغذى بشكل رئيسي على اللافقاريات حيث يسقط عليها من مجثم ويأكل الفواكه والثمار البرية من وقت لآخر.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).





تمير نيلي
Hedydipna metallica
(Lichtenstein, 1823)



التوزيع العالمي: مقيم، مع بعض الانتشار الشتوي. يوجد في جنوب غرب الجزيرة العربية وشمال شرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في وادي نخلة.
القياسات: طول الذكر: 17 سم والأنثى: 9 سم، الوزن: 7-8 جم.
الصفات المميزة: تميرة صغيرة وذات منقار قصير نسبيا. الذكور في موسم التكاثر مميزة جدا حيث يظهر لها لون أخضر لامع للجزء العلوي والصدر أسود مع انعكاسات بنفسجية والبطن أصفر ولها ذيل فارع الطول. الجزء العلوي للأنثى بني اللون مائل للرمادي والسفلي والحاجب لونهما أصفر باهت والذيل قصير والصدر يميل للون الأبيض.
الموائل والمعيشة: يوجد عادة في أزواج خلال موسم التكاثر أو في مجموعات صغيرة في غير ذلك، يوجد في السهول الجافة والأودية والواحات والحدائق. يتحرك بتوتر أو بحذر بين النباتات. يتغذى بشكل رئيسي على الرحيق وعلى الحشرات حيث يستخلصها من أوراق الأشجار. يبني عشا بيضاوي الشكل متدلي من فروع الأشجار.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

تمير فلسطيني
Cinnyris osea
Bonaparte, 1856



التوزيع العالمي: مقيم في جنوب بلاد الشام وغرب وجنوب شبه جزيرة العرب، كما يوجد منه مجتمعات صغيرة في أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا عدا شرعان والغراميل وحرة خيبر وتيماء.
القياسات: الطول: 8-10 سم، الوزن: 7-8 جم.
الصفات المميزة: تميرة ضئيلة الحجم ممتلئة الجسم ولها منقار طويل منحني بلون بني (أصغر من التمير العربي) والذيل قصير حيث يرفرف به بشكل متواتر منتظم. الذكر داكن الألوان ويعكس درجة لون أزرق وبنفسجي وأخضر في الإضاءة المناسبة. الأنثى لونها رمادي مع صدر أكثر شحوبا من الذكر ولها ذيل أسود.
الموائل والمعيشة: يوجد في البيئات التي تنتشر فيها الأكاسيات فيما يشبه السفانا وفي الأودية والواحات والمزارع والحدائق. يبحث عن الغذاء بشكل فردي أو زوجي على الرحيق بشكل أساسي حيث يحلق أو يجثم على الأزهار ولكن يقتات على الفواكه والبذور واللافقاريات أيضا. يبني أعشاشا متدلية من الأشجار والشجيرات.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

تمير عربي
Cinnyris hellmayri
(Neumann, 1904)



التوزيع العالمي: مقيم، أصيل للجزيرة العربية يوجد في غرب وجنوب الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: واحات العلا ووادي نخلة وجبل شيهوب وجبل الورد وحرة عويرض.القياسات: الطول: 12-13 سم، الوزن: 7-12 جم.
الصفات المميزة: متوسط الحجم ذو منقار منحني للأسفل يرفرف ذيله العريض بشكل بطيء (مقارنة بالتمير الفلسطيني). الذكر لونه داكن أخضر لامع مع لون أزرق على الرأس والظهر والصدر وطوق الصدر العريض مائلة للون الأحمر. الأنثى لونها رمادي داكن أسخم والحاجب باهت والجزء السفلي بخطوط عرضية مموجة.
الموائل والمعيشة: عادة ما يوجد في أزواج في جروف الأودية شديدة الانحدار أو جوانب التلال والسهول الجافة والبساتين والمزارع والمتنزهات والحدائق. يتغذى على الرحيق والفواكه والحشرات التي يقبض عليها وهو يطير. يبني عشا يشبه القارورة متدلي من الأشجار والشجيرات.
الحالة: مقيم.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



تبشر
Ploceus galbula
Rüppell, 1840[1]

التوزيع العالمي: مقيم، ينتشر في جنوب غرب الجزيرة العربية وشمال شرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: واحات العلا.
القياسات: الطول: 14 سم، وزن الذكور: 20-29 سم والأنثى: 16-21 جم.
الصفات المميزة: الذكور المتكاثرة ذات لون أصفر ووجه ومنقار أسود والعيون حمراء والظهر مخطط بلون زيتوني يميل للأخضر، لون الأنثى بني زيتوني والصدر والحلق يميلان للون الأصفر، والعيون داكنة والمنقار مع الجزء السفلي للجسم شاحبة اللون.
الموائل والمعيشة: يوجد في حقول المحاصيل والمناطق التي تنتشر فيها الأكاسيات فيما يشبه السفانا وفي الأودية والحدائق. يتغذى على الثمار ويبحث عن الغذاء في مجموعات صغيرة مختلطة مع أنواع أخرى. طائر اجتماعي يصنع أعشاشا تشبه السلة معلقة على الأشجار مع أعشاش أخرى لنفس النوع. وهو النسّاج الوحيد المقيم في المنطقة من جنسه.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

فضي منقار أفريقي
Euodice cantans
(Gmelin, 1789)[2]

التوزيع العالمي: مقيم، يوجد في جنوب غرب الجزيرة العربية وفي الساحل الأفريقي وبشكل متناثر في شرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: واحات العلا وخيبر القديمة.
القياسات: الطول: 11 سم، الوزن: 10-14 جم.
الصفات المميزة: صغير الحجم ممتلئ الجسم ذو منقار سميك قصير ومخروطي الشكل لونه رصاصي والذيل طويل. مموج بلون بني للجزء العلوي ولون كريمي للجزء السفلي. الأجنحة والجزء الأخير من الظهر مع الذيل وريش الذيل العلوي داكنة اللون.
الموائل والمعيشة: يوجد في مجموعات صغيرة في الأراضي العشبية والسهول والمزارع وبساتين النخيل والواحات والحدائق. يتغذى بشكل رئيسي على البذور على الأرض أو جاثما على النباتات، ويأكل اللافقاريات من حين لآخر. يعشش في الأحراش والأشجار.
الحالة: مقيم.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

سوداء (الخناق الرمادي)
Hypocolius ampelinus
Bonaparte, 1850



التوزيع العالمي: مهاجر، يتكاثر على امتداد شرق العراق إلى غرب أفغانستان. يقضي الشتاء في الجزيرة العربية وعلى امتداد الساحل الجنوبي الشرقي لإيران حتى شمال غرب الهند.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا وخيبر القديمة.
القياسات: الطول: 23 سم، الوزن: 48-57 جم.
الصفات المميزة: نحيل طويل الذيل متوسط الحجم لونه رمادي باهت والذيل قصير. للذكور قناع أسود والريش الأولي أسود مع أطراف بيضاء تعطي مظهر "اليد" باللونين الأبيض والأسود أثناء الطيران. أطراف الذيل سوداء وتكون أعرض في الذكور.
الموائل والمعيشة: يوجد على الأشجار في أسراب صغيرة (10-20 فردا) ويوجد بشكل رئيسي في الواحات وبساتين النخيل والبساتين الأخرى والحدائق. يتغذى على الثمار البرية الصغيرة والفواكه وفي بعض الأحيان على الحشرات.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



عصفور دوري
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: عصفور مقيم، يوجد في أغلب أجزاء القطب الشمالي القديم وفي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما أدخل في أغلب أنحاء العالم.
التوزيع في العلا: يوجد في كل مناطق العلا.
القياسات: الطول: 15-17 سم، الوزن: 27-29 جم.
الصفات المميزة: الجزء العلوي بني ذو خطوط سوداء كثيفة والجزء السفلي رمادي باهت. للذكر تاج رمادي وأشرطة بيضاء على الجناح والجزء العلوي من الصدر والمنقار وبقعة بين العين والمنقار سوداء.
الموائل والمعيشة: يوجد في أسراب مرتبطة بوجود البشر في المدن والقرى والمخيمات والمزارع. يتغذى على الأرض على البذور والفواكه والثمار البرية الصغيرة واللافقاريات وبقايا الطعام من مخلفات البشر، يعشش في التجاويف وتحت مواقع تعشيش الطيور الكبيرة وفي الأحراش والأشجار.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

عصفور أسباني
Passer hispaniolensis
(Temminck, 1820)



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر على امتداد متقطع من أيبريا وشمال غرب أفريقيا إلى شمال غرب الصين، يقضي الشتاء في شمال أفريقيا وفي الجزيرة العربية وجنوب آسيا.
التوزيع في العلا: سجل في واحات العلا ووادي نخلة وحرة خيبر وحرة عويرض والغراميل وتيماء.
القياسات: الطول: 15-16 سم، الوزن: 22-38 جم.
الصفات المميزة: يشبه حجم العصفور الدوري ولكن الذكر يختلف حيث أن له تاجا بنيا محمرا وحاجبا وخدودا بيضاء وله نقاط سوداء كثيفة على الصدر وعلى جانبي الجسم، الأنثى متطابقة الشكل والألوان لأنثى العصفور الدوري.
الموائل والمعيشة: يوجد في أسراب في المزارع وأراضي المحاصيل المفتوحة والواحات وبساتين النخيل والأراضي ذات النباتات القصبية والأودية. يبحث عن الغذاء على الأرض ويأكل البذور بشكل رئيسي ولكنه يقتات أيضا على الثمار البرية الصغيرة واللافقاريات. غالبا ما يعشش في مستعمرات في قاعدة مواقع تعشيش الطيور الكبيرة الأخرى وكذلك في فجوات البنايات وفي الأحراش والأشجار.
الحالة: مقيم، زائر شتوي.
الوفرة: قليل، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

عصفور صخري شاحب
Carpospiza brachydactyla
(Bonaparte, 1850)

التوزيع العالمي: مهاجر، يمتد نطاق تكاثره من جنوب شرق تركيا حتى جنوب شرق تركمانستان ويمتد للجنوب حتى الجزيرة العربية، يقضي الشتاء في غرب المملكة العربية السعودية وشمال شرق أفريقيا.
التوزيع في العلا: يوجد في حرة خيبر. القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 21-25 جم.
الصفات المميزة: عصفور مستطيل الجسم بلا نقوش وألوان بارزة بلون عام بني باهت، الأجنحة طويلة ولها شكل المثلث، لها حاجب شاحب اللون وشريطان باهتان على الجناح، وأطراف ريش الذيل بيضاء.
الموائل والمعيشة: اجتماعي يوجد في مجموعات في غير موسم التكاثر في المناطق الصخرية والسهول الخضراء والبيئات شبه الصحراوية والأراضي الزراعية المفتوحة. يتغذى على الأرض وبشكل رئيسي على البذور وعلى النباتات واللافقاريات. يعيش في الأشجار والأحراش.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي، مهاجر متكاثر.
الوفرة: غير شائع، غير شائع، غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

عصفور دوري
Passer domesticus

عصفور إسباني
Passer hispaniolensis

عصفور صخري شاحب
Carpospiza brachydactyla

جشنة شجرية
Anthus trivialis
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: مهاجر، نطاق تكاثره يمتد من غرب أوروبا إلى شرق روسيا ويقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والهند.
التوزيع في العلا: يوجد في واحات العلا.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 15-39 جم.
الصفات المميزة: جشنة صغيرة مستطيلة الجسم ومخططة بكثافة، المنقار سميك وقاعدته تميل للون الوردي والأرجل وردية والصدر وجانبا البطن مصفرة اللون والبطن أبيض. له خطوط عريضة على الجزء السفلي من ناحية الصدر وضيقة على الجانبين.
الموائل والمعيشة: توجد بشكل رئيسي في المناطق الرطبة الخضراء مثل حقول المحاصيل والحدائق والمتنزهات والمزارع والواحات. عادة ما توجد في مجموعات صغيرة جاثمة على الأشجار والأحراش أو على الأرض حيث تتغذى على اللافقاريات وفي بعض الأحيان على البذور والثمار البرية الصغيرة.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

جشنة حمراء زور
Anthus cervinus
(Pallas, 1811)



التوزيع العالمي: يعتبر هذا النوع من الطيور المهاجرة، يتكاثر من القطب الشمالي الأوراسي حتى غرب ألاسكا. يقضي الشتاء في حوض البحر المتوسط وعلى امتداد نهر النيل وشمال الجزيرة العربية وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا.
التوزيع في العلا: توجد خارج المناطق المحمية في حدائق مدينة العلا.
القياسات: الطول: 14-15 سم، الوزن: 16-29 جم.
الصفات المميزة: جشنة صغيرة منقارها صغير مبطن بلون مصفر على القاعدة والجزء السفلي باهت. الريش في الذكور المتكاثرة ذو لون فريد يميل للأحمر على الوجه والحلق والجزء العلوي للصدر. الذكر أكثر حمرة من الأنثى. الصغار والأفراد البالغة غير التكاثرية لها خطوط عريضة على الجوانب للنصف الخلفي ونقوش شريطية النمط بيضاء على الظهر، والجزء الأخير للظهر قبل قاعدة الذيل ذو خطوط بارزة وداكنة.
الموائل والمعيشة: يوجد في مجموعات صغيرة في حقول المحاصيل والأراضي العشبية والمروج الخضراء والمتنزهات والحدائق عادة بالقرب من مصادر المياه. يتغذى على الأرض وبشكل رئيسي على اللافقاريات وعلى البذور أحيانا.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

جشنة صحماء
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)



التوزيع العالمي: جشنة مهاجرة، نطاق تكاثرها يمتد من غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا إلى منغوليا، يقضي الشتاء في الساحل والقرن الأفريقي وعلى امتداد نهر النيل والجزيرة العربية وجنوب آسيا.
التوزيع في العلا: يوجد في وادي نخلة والغراميل وحرة خيبر وشرعان وحرة الزبن.
القياسات: الطول: 17 سم، الوزن: 17-32 جم.

الصفات المميزة: جشنة كبيرة ورفيعة الجسم، الجزء العلوي لونه رملي إلى بني والجزء السفلي باهت يميل للون الأصفر، المنقار والأرجل طويلة. لها حاجب طويل والقفا داكن اللون بدون خطوط في الغالب والظهر أسود يتباين بشكل كبير مع الريش الكاسي للجناح، وحواف الذيل بيضاء. للصغار نقوش خطية النمط أكثر من الأفراد البالغة.
الموائل والمعيشة: يوجد عادة في مجموعات صغيرة في المناطق الرملية ذات الغطاء النباتي وحقول المحاصيل والمروج الخضراء والمتنزهات. يبحث عن الغذاء على الأرض وتتغذى على اللافقاريات بشكل رئيسي والسحالي والبذور من حين لآخر.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالمياً (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

ذعرة صفراء
(ذعرة سوداء الرأس)
Motacilla flava
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: ذعرة مهاجرة، تتكاثر عبر أوروبا ومعظم آسيا، تقضي الشتاء في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي الهند وأجزاء من الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: خيبر القديمة وحرة خيبر ووادي نخلة.
القياسات: الطول: 17 سم، الوزن: 11-26 جم.
الصفات المميزة: ذعرة قصيرة الذيل والجزء العلوي بني زيتي يميل إلى اللون الأخضر، والجزء السفلي شديد الاصفرار والأرجل داكنة اللون. الرأس ذو ألوان متغايرة من الأسود والرمادي إلى الأصفر اعتمادا على الجنس والعمر والنوع. الأنثى دائما ما تكون أبهت لونا من الذكر.
الموائل والمعيشة: يوجد في الأراضي الرطبة ذات النباتات القصيرة مثل حقول المحاصيل والأراضي التي يتم ريها وحقول النبات القصبية. يتغذى بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة أو في مجموعات كبيرة أحيانا خلال موسم الهجرة ويقتات على اللافقاريات والأجزاء النباتية.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: غير شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).

ذعرة رمداء
Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في أوروبا وشمال آسيا، يقضي الشتاء حول حوض البحر المتوسط ومن شرق أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.
التوزيع في العلا: خيبر القديمة. القياسات: 17-20 سم، الوزن 14-22 جم. الصفات المميزة: ذعرة أنيقة طويلة الذيل بلون أزرق رمادي على الجزء العلوي وأجنحة سوداء. العجز بلون أصفر فاتح وريش الجزء الأخير من الظهر أصفر مخضر. الأرجل قصيرة يميل لونها للوردي. الجزء السفلي للذكور المتكاثرة أصفر الجزء العلوي للصدر أصفر والحاجب أبيض، وخطوط بيضاء تحت الشارب. الموائل والمعيشة: يوجد فرادى وبشكل حصري قرب مصادر المياه الجارية مثل الجداول والغدران الجبلية والنوافير والسواقي في المزارع. يتغذى بشكل رئيسي على الحشرات المائية وكذلك على الحلزونات والقشريات، غالبا ما تهز بذيلها الطويل.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وقريب من التهديد إقليميا (NT).

ذعرة بيضاء
Motacilla alba
Linnaeus, 1758



التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر في أوراسيا ويقضي الشتاء على امتداد من أفريقيا حتى جنوب شرق آسيا.
التوزيع في العلا: توجد في واحات العلا ووادي نخلة ومحمية شرعان وحرة خيبر والغراميل وحرة عويرض وجبل نهر.
القياسات: الطول: 17-18 سم، الوزن: 18-25 جم.
الصفات المميزة: ذعرة لونها أبيض وأسود الجزء العلوي رمادي والوجه والجزء السفلي أبيضا اللون وطوق العنق أو الجزء الأعلى من الصدر والأرجل داكنة اللون.
الموائل والمعيشة: يوجد في البيئات المفتوحة عادة بالقرب من مصادر المياه والحدائق والمزارع أيضا على جوانب الطرق. يبحث عن الحشرات على الأرض حيث يصدر حركات مميزة بهز الذيل.
الحالة: مهاجر عابر، زائر شتوي.
الوفرة: شائع، شائع.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) ولم يتم تقييمه إقليميا (NE).



حسون ورد شائع
Carpodacus erythrinus
(Pallas, 1770)

التوزيع العالمي: مهاجر، نطاق تكاثره يمتد من غرب أوروبا إلى شرق آسيا والشرق الأقصى لروسيا. يقضي الشتاء من الهند إلى جنوب الصين.
التوزيع في العلا: حرة خيبر.
القياسات: الطول: 13-15 سم، الوزن: 19-33 جم.
الصفات المميزة: طائر صغير ذو منقار قصير وسميك رمادي اللون. يمكن تمييز الذكر بسهولة حيث أن له رأسا أحمر اللون والصدر والردف وقناع العين بني. الأنثى والصغار لها خطوط بلون بني زيتي مع شريطين على الجناح.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى على الأشجار أو السهول الخضراء حيث يبحث عن الغذاء المكون من البذور والثمار البرية والفواكه ولكن يبحث عن الغذاء على الأرض أيضا.
الحالة: مهاجر عابر.
الوفرة: نادر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وهامشي إقليميا (NA) لم يحظ بالتقييم.

حسون ورد سينائي
Carpodacus synoicus
(Temminck, 1825)



التوزيع العالمي: نوع مقيم، يوجد على امتداد من شبه جزيرة سيناء إلى شمال غرب الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في كل أنحاء العلا ماعدا جبل شيهوب وحرة خيبر وخيبر القديمة وتيماء.
القياسات: الطول 13-15.5 سم، الوزن: 17-24 جم.
الصفات المميزة: يشبه حسون الورد الشائع ولكن أقل نقوشا وأرفع جسما والمنقار مخروطي أكثر. للذكور رأس قرمزي اللون والظهر والجزء السفلي للجسم ورديان. الأنثى لونها بني فاتح وتفتقد للنقوش.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج في موسم التكاثر وفي مجموعات مكونة من أفراد نفس الفصيلة خلال فصل الشتاء تنتشر على الجروف والمنحدرات ومنها الأحجار الرملية والمناطق الصخرية الجرداء والسهول الصحراوية. يتغذى على البذور والبراعم وأوراق النباتات. يعشش على الجروف وفي بعض الأحيان على الأرض.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

حسون كزبري
Bucanetes githagineus
(Lichtenstein, 1823)



التوزيع العالمي: مقيم، ينتشر من شمال أفريقيا إلى باكستان.
التوزيع في العلا: ينتشر في أغلب أنحاء العلا باستثناء خيبر القديمة وتيماء.
القياسات: الطول: 13-15 سم، الوزن: 16-25 جم.
الصفات المميزة: طائر صغير وممتلئ الجسم. اللون العام شاحب، والرأس كبير، والأجنحة طويلة، والمنقار ثخين لونه برتقالي في الذكور وباهت في الإناث. الذكور البالغة رمادية اللون والجزء السفلي والأجنحة ومؤخرة الظهر لونها وردي خفيف. الأنثى والصغار أكثر شحوبا والصغار تفتقد اللون الوردي.
الموائل والمعيشة: طيور اجتماعية المعيشة توجد على السهول الصخرية وعلى جوانب وسفوح التلال ذات الغطاء النباتي المتناثر وتوجد في الأودية والحرات والأراضي شبه الصحراوية. تتغذى على البذور والبادرات النباتية والثمار البرية الصغيرة وتبحث عن الغذاء على الأرض. تعشش على الأرض أو في الشقوق الصخرية.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).



حسون صحراوي
Rhodospiza obsoleta
(Lichtenstein, 1823)

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، يتكاثر بشكل متقطع في وسط وشمال الجزيرة العربية ويمتد نطاق التكاثر إلى تركيا وشمال الصين. الجماعات المهاجرة تتكاثر في كازاخستان وتقضي الشتاء في أفغانستان.
التوزيع في العلا: يوجد في تيماء.
القياسات: الطول: 15 سم، الوزن: 17-28 جم.
الصفات المميزة: لونه العام بني رمادي وله منقار قصير مدبب والذيل بلون أسود وأبيض ونقوش الجناح مميزة بألوان الأبيض والأسود والوردي وتكون باهتة في الإناث. المنقار والقفا في الذكر لونها أسود وشاحبة في الإناث.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو أسراب صغيرة في البساتين الشجرية وحقول الري المحوري والمزارع وبالقرب من السهول الجرداء والمدن. يتغذى على البذور والبادرات النباتية والبراعم والحشرات. يعشش في الأشجار والأحراش.
الحالة: مقيم.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

نقّار عربي
Crithagra rothschildi
(Ogilvie-Grant, 1902)



التوزيع العالمي: مقيم وأصيل للجزيرة العربية، ينتشر في غرب الجزيرة العربية.
التوزيع في العلا: يوجد في كل مناطق العلا باستثناء الغراميل ومحمية شرعان وحرة خيبر وتيماء.
القياسات: الطول: 11-12 سم، الوزن: 14 جم.
الصفات المميزة: صغير الحجم ضعيف البنية وليس له صفات بارزة، لونه العام بني رمادي والحلق باهت والجزء السفلي باهت بنقوش على شكل بقع ضبابية قليلة التباين. مؤخرة الظهر لونها زيتوني يظهر خلال الطيران.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو مجموعات صغيرة بين النباتات في الجبال الصخرية الجرداء وجوانب التلال وفي الأودية والواحات والمزارع. يتغذى على الأرض أو بين النباتات ويقتات على البذور والبراعم والفواكه. يعشش في الأشجار والأحراش.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

درسة قمحية
Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

التوزيع العالمي: مهاجر جزئي، نطاق التكاثر يمتد من غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا إلى آسيا مع وجود مجتمعات متناثرة تتكاثر في بعض أجزاء الجزيرة العربية. تقضي الشتاء في شمال أفريقيا وشمال وغرب الجزيرة العربية وفي إيران.
التوزيع في العلا: سجل في محمية شرعان.
القياسات: الطول: 17-19 سم، الوزن: 32-67 جم.
الصفات المميزة: درسة كبيرة ممتلئة الجسم عديمة الملامح إلى حد ما، لونها العام بني رملي والأرجل والمنقار لونها وردي مشبع. الجزء السفلي باهت ذو خطوط داكنة.
الموائل والمعيشة: يوجد فرادى أو في مجموعات صغيرة يفضل المناطق المفتوحة ذات الأحراش المتناثرة والمزارع والأراضي العشبية. يتغذى على الأرض ويأكل البذور بشكل أساسي ويقتات على اللافقاريات أيضا.
الحالة: زائر شتوي.
الوفرة: قليل.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

درسة رفيعة تخطيط
Emberiza striolata
(Lichtenstein, 1823)



التوزيع العالمي: نوع مقيم، يوجد بشكل متناثر في شمال شرق أفريقيا وسيناء وفلسطين والأردن ومن غرب وجنوب الجزيرة العربية وجنوب إيران حتى باكستان.
التوزيع في العلا: ينتشر في أغلب أنحاء العلا باستثناء الغراميل وخيبر القديمة وتيماء.

القياسات: الطول: 12-13 سم، الوزن: 12-16 جم.
الصفات المميزة: درسة صغيرة الحجم ذات جناح بني محمر وجسم بني إلى رملي اللون والوجه مخطط بلون أبيض رمادي والعنق مخطط باللون الرمادي. المنقار ثنائي اللون داكن من قاعدة المنقار العلوي وبرتقالي للأسفل. ألوان الأنثى والصغار أكثر شحوبا من الذكور.
الموائل والمعيشة: يوجد في أزواج أو أسراب صغيرة في الواحات والأودية الصخرية والتلال ذات النباتات المتناثرة والمزارع، يبحث عن الغذاء على الأرض أو بين النباتات وتقتات على البذور، وفي بعض الأحيان يتغذى على الفواكه والحشرات. يعشش في شقوق المنحدرات والجدران.
الحالة: مقيم.
الوفرة: وافر.
حالة الحفظ: غير مهدد عالميا (LC) وغير مهدد إقليميا (LC).

9. مناطق ذات أهمية بالنسبة للطيور

وفقًا لتوزيع ثراء الأنواع، تقع أهم المناطق بالنسبة للطيور في شرعان، ووادي نخلة، والسفوح الغربية والشرقية لحرة عويرض، وحرة الزبن (الشكل 25).



الشكل 25 | توزيع ثراء أنواع الطيور في محافظة العلا. الشريط التوضيحي على اليمين يشير إلى عدد الأنواع.

10.قائمة أنواع الطيور العلا

الفصيلة / الاسم الشائع	الاسم العلمي	النوع: الحالة	حالة الحفظ حسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN): عالميًا	حالة الحفظ حسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN): إقليميًا
نعامية				
النعام الشائع	*Struthio camelus*	مقيم	غير مهدد (LC)	منقرض (RE)
تدرجية				
حجل شائع	*Alectoris chukar*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حجل عربي	*Alectoris melanocephala*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حجل رملي	*Ammoperdix heyi*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سماني شائعة	*Coturnix coturnix*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حمامية				
يمامة برية	*Columba livia*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حمحم	*Oena capensis*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
فاختة النخيل	*Spilopelia senegalensis*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
فاختة أوراسية	*Streptopelia decaocto*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
فاختة أفريقية	*Streptopelia roseogrisea*	مهاجر متكاثر، ومهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قمري أوروبي	*Streptopelia turtur*	مهاجر متكاثر، ومهاجر عابر	معرض للانقراض (VU)	غير مهدد (LC)
قطويات				
كدرية حجازية	*Pterocles lichtensteinii*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
طائر السبد				
سبد أوروبي	*Caprimulgus europaeus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
سبد مصري	*Caprimulgus aegyptius*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
السبد النوبي	*Caprimulgus nubicus*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سمامة				
سمامة ألبية	*Tachymarptis melba*	مهاجر متكاثر، ومهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سمامة شائعة	*Apus apus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سمامة فاتحة	*Apus pallidus*	مهاجر متكاثر، ومهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
وقواق				
وقواق أرقط كبير	*Clamator glandarius*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)

الفصيلة / الاسم الشائع	الاسم العلمي	الحالة	عالميًا	إقليميًا
مرعية				
فرفر شائع	*Gallinula chloropus*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
لقلقية				
لقلق أبيض غربي	*Ciconia ciconia*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
لقلق أسود	*Ciconia nigra*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقَيَّم (NE)
بلشونيات				
بلشون أرمد	*Ardea cinerea*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
بلشون أرجواني	*Ardea purpurea*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
بلشون مذهب	*Ardeola ralloides*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
بلشون بقر غربي	*Bubulcus ibis*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
غرنوق أبيض صغير	*Egretta garzetta*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
بلشون ليل أرأس	*Nycticorax nycticorax*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
زقزاقية				
قطقاط أشوك	*Vanellus spinosus*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبو اليسر				
دراج شائع	*Cursorius cursor*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
البوم الحقيقي				
صدى	*Athene noctua*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
ثبج فاتح	*Otus brucei*	زائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
بومة الصحراء	*Strix hadorami*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
بوهة صحراوية	*Bubo ascalaphus*		غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
الطُّيطونيّات				
هامة	*Tyto alba*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
الحدَآنيّات				
زرق شائع	*Elanus caeruleus*	زائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
البازية				
عقيب العسل أوروبية	*Pernis apivorus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقَيَّم (NE)
عقيب العسل شرقية	*Pernis ptilorhynchus*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
رخمة	*Neophron percnopterus*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	مهدد بالانقراض (EN)	معرض للانقراض (VU)
نسر أوراسي	*Gyps fulvus*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	مهدد بالانقراض (EN)
نسر مسود	*Aegypius monachus*	زائر شتوي	قريب من التهديد (NT)	غير مُقَيَّم (NE)

الفصيلة / الاسم الشائع	الاسم العلمي	الحالة	عالميًا	إقليميًا
نسر أذن	*Torgos tracheliotos*	مقيم	مهدد بالانقراض (EN)	معرض للانقراض (VU)
عقاب رقطاء كبرى	*Clanga clanga*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	معرض للانقراض (VU)	غير مُقيَّم (NE)
عقاب سهبية	*Aquila nipalensis*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	مهدد بالانقراض (EN)	غير مُقيَّم (NE)
عقاب ملكية شرقية	*Aquila heliaca*	زائر شتوي	معرض للانقراض (VU)	غير مُقيَّم (NE)
عقاب مذهبة	*Aquila chrysaetos*	مقيم	غير مهدد (LC)	مهدد بالانقراض (EN)
عقاب خدارية	*Aquila verreauxii*	مقيم	غير مهدد (LC)	مهدد بالانقراض (EN)
عقاب بونلية	*Aquila fasciata*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
صرارة	*Circaetus gallicus*	مهاجر متكاثر، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	معرض للانقراض (VU)
عقاب مسيرة	*Hieraaetus pennatus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
مرزة مستنقعية	*Circus aeruginosus*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
مُرْزَة بغثاء	*Circus macrourus*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	قريب من التهديد (NT)	غير مُقيَّم (NE)
مرزة مونتجوية	*Circus pygargus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
بيدق آسيوي	*Accipiter badius*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
باشق مشرقي	*Accipiter brevipes*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
باشق أوراسي	*Accipiter nisus*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
حدأة سوداء	*Milvus migrans*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
عقيب شائعة	*Buteo buteo*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سقاوة	*Buteo rufinus*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
هدهدية				
هدهد أوراسي	*Upupa epops*	مقيم، ومهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
رفراف النهر				
رفراف شائع	*Alcedo atthis*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
الرفراف أصدر	*Halcyon smyrnensis*	زائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
وروارية				
قارية خضراء	*Merops cyanophrys*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قارية زرقاء الخدين	*Merops persicus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قارية أوروبية	*Merops apiaster*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
شقراقية				
شقراق أوروبي	*Coracias garrulus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)

الفصيلة / الاسم الشائع	الاسم العلمي	الحالة	عالميًا	إقليميًا
نقار الخشب				
لَوَّاء أوراسي	*Jynx torquilla*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
قراع عربي	*Dendropicos dorae*	مقيم	قريب من التهديد (NT)	معرض للانقراض (VU)
صقرية				
عوسق	*Falco tinnunculus*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
صقر أسحم	*Falco concolor*	مهاجر متكاثر، ومهاجر عابر	معرض للانقراض (VU)	مهدد بالانقراض (EN)
شويهين أوراسي	*Falco subbuteo*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
شاهين	*Falco peregrinus*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	معرض للانقراض (VU)
ببغائية				
درة مطوقة	*Alexandrinus krameri*	مقيم)دخيل(	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
درة إسكندرية	*Palaeornis eupatria*	مقيم	قريب من التهديد (NT)	هامشي، لم يقيم (NA)
الطُّيُورُ الصُّفَّارِيَّة				
صفارية أوراسية	*Oriolus oriolus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
الغرابيات				
غراب أدرع	*Corvus ruficollis*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
غداف	*Corvus rhipidurus*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
دقنوش				
دغناش أمغر	*Lanius collurio*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
دغناش داوري	*Lanius isabellinus*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
صُرَد صغير	*Lanius minor*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
صُرَد كبير	*Lanius excubitor*	مقيم، ومهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
دغناش شامي	*Lanius senator*	مهاجر عابر	قريب من التهديد (NT)	غير مهدد (LC)
دغناش مبرقع	*Lanius nubicus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قبرة				
مكاء	*Alaemon alaudipes*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قبرة شدقاء	*Ramphocoris clotbey*	مقيم، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حمرة صبغاء	*Ammomanes cinctura*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حمرة صحراوية	*Ammomanes deserti*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أكيد أسود تاج	*Eremopterix nigriceps*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قبرة عربية	*Eremalauda eremodites*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قبرة صبيعاء صغيرة	*Alaudala rufescens*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قبرة صبيعاء عربية	*Calandrella eremica*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)

الفصيلة / الاسم الشائع	الاسم العلمي	الحالة	عالميًا	إقليميًا
قُبّرة صُبَيْعاء كبيرة	*Calandrella brachydactyla*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قبرة الصحراء المقرنة	*Eremophila bilopha*	مقيم، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
قبرة شائعة	*Galerida cristata*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سنونو				
خطاف عجز	*Delichon urbicum*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سنونو أحمر عجز	*Cecropis daurica*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سنونو شائع	*Hirundo rustica*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
عوهق جرفي أوراسي	*Ptyonoprogne rupestris*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
عوهق جرفي فاتح	*Ptyonoprogne obsoleta*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
خطاف رملي	*Riparia riparia*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
البلابل				
بلبل أغشى	*Pycnonotus leucotis*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
كعيت	*Pycnonotus xanthopygos*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
ساكنات القريضة				
نمنمة ذنوب	*Prinia gracilis*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
الدخلة الشجيرية				
دخلة شجيرية	*Scotocerca inquieta*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
هازجية				
دخناء أوراسية	*Acrocephalus scirpaceus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
دخناء زيتونية شرقية	*Iduna pallida*	مهاجر عابر، ومهاجر متكاثر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
الدخلات الورقيّة				
دخلة صفصافية	*Phylloscopus trochilus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
دخلة شائعة	*Phylloscopus collybita*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
نقشارة سيبيرية	*Phylloscopus tristis*	زائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
نقشارة صفراء حاجب	*Phylloscopus inornatus*	شارد	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
الدخلية				
هازجة مقلنسة أوراسية	*Sylvia atricapilla*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
هازجة حدائقية	*Sylvia borin*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
هازجة صحراوية آسيوية	*Curruca nana*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
هازجة عربية	*Curruca leucomelaena*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
زوراء صغيرة	*Curruca curruca*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
هازجة رأساء	*Curruca mystacea*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)

الفصيلة / الاسم الشائع	الاسم العلمي	الحالة	عالميًا	إقليميًا
هازجة سردينية	*Curruca melanocephala*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
هازجة مغردة شرقية	*Curruca cantillans*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
زوراء شائعة	*Curruca communis*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
بهدليات				
بلنصي عربي	*Argya squamiceps*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
زرزور				
ضوعة	*Onychognathus tristramii*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
ماينا شائع	*Acridotheres tristis*	مقيم)دخيل(	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
سمنة				
سُمْنة مغردة	*Turdus philomelos*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
صائدة الذباب				
شوالة	*Cercotrichas galactotes*	مهاجر عابر، ومهاجر متكاثر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
سوادية	*Cercotrichas podobe*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
صائد ذباب أرقط	*Muscicapa striata*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
زرقاء زور	*Luscinia svecica*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
عندليب	*Luscinia luscinia*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
حميراء سوداء	*Phoenicurus ochruros*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
حميراء شائعة	*Phoenicurus phoenicurus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
سمنة صخرية زرقاء	*Monticola solitarius*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
برقش أحمر	*Saxicola rubetra*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
برقش	*Saxicola torquatus*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق أسود الذنب	*Oenanthe melanura*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق شمالي	*Oenanthe oenanthe*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق درجي	*Oenanthe isabellina*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق كردي	*Oenanthe xanthoprymna*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق أبيض مَنة	*Oenanthe leucopyga*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق مقلنس	*Oenanthe monacha*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق حزين شرقي	*Oenanthe lugens*	مقيم، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق صحراوي	*Oenanthe deserti*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق أغشى شرقي	*Oenanthe hispanica*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
أبلق أبقع	*Oenanthe pleschanka*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)

الفصيلة / الاسم الشائع	الاسم العلمي	الحالة	عالميًا	إقليميًا
تمير				
تمير نيلي	*Hedydipna metallica*	زائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
تمير فلسطيني	*Cinnyris osea*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
تمير عربي	*Cinnyris hellmayri*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حباك				
تبشر	*Ploceus galbula*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
شمعية المنقار				
فضي منقار أفريقي	*Euodice cantans*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
خناق رمادي				
سويداء	*Hypocolius ampelinus*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
دوري				
عصفور دوري	*Passer domesticus*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
عصفور إسباني	*Passer hispaniolensis*	مقيم، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
عصفور صخري شاحب	*Carpospiza brachydactyla*	مهاجر عابر، وزائر شتوي، ومهاجر متكاثر	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
تمرة				
جشنة شجرية	*Anthus trivialis*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
جشنة حمراء الصدر	*Anthus cervinus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
جشنة صحماء	*Anthus campestris*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
ذعرة صفراء	*Motacilla flava*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
ذعرة رمداء	*Motacilla cinerea*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	قريب من التهديد (NT)
ذعرة بيضاء	*Motacilla alba*	مهاجر عابر، وزائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مُقيَّم (NE)
شرشوريات				
حسون ورد شائع	*Carpodacus erythrinus*	مهاجر عابر	غير مهدد (LC)	هامشي، لم يقيم (NA)
حسون ورد سينائي	*Carpodacus synoicus*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حسون كزبري	*Bucanetes githagineus*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
حسون صحراوي	*Rhodospiza obsoleta*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
نقّار عربي	*Crithagra rothschildi*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
عنبريات				
درسة قمحية	*Emberiza calandra*	زائر شتوي	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
درسة رفيعة تخطيط	*Emberiza striolata*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)
درسة رفيعة تخطيط	*Emberiza striolata*	مقيم	غير مهدد (LC)	غير مهدد (LC)

حالة الهجرة والإقامة، وحالة التهديد حسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) لطيور العلا.

11. المراجع

Al-Sirhan, A., Eriksen, J. & Porter, R. (2022). Birds of the Middle East, A Photographic Guide. Christopher Helm, London, pp. 224.

Avibase (2023) The World Bird Database. Downloaded from https://avibase.bsc-eoc.org/ on 15/12/2023.

Billerman, S. M., Keeney, B. K., Rodewald, P. G., & Schulenberg T. S. (Editors) (2022). Birds of the World. Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://birdsoftheworld.org/bow/home

BirdLife International (2023) IUCN Red List for birds. Downloaded from https://datazone.birdlife.org on 15/12/2023.

Boland, C. & Alsuhaibany, A. (2020) The Birds of Saudi Arabia. Vol 1, Motivate Media Group, Dubai

Boland, C. & Alsuhaibany, A. (2020) The Birds of Saudi Arabia. Vol 2, Motivate Media Group, Dubai

Brito, J.C. & Pleguezuelos, J.M. (2020). Desert Biodiversity—World's Hot Spots/ Globally Outstanding Biodiverse Deserts. In: Goldstein MI, DellaSala DA (Eds.), *Encyclopedia of the World's Biomes*, vol. 2. Elsevier, pp. 10–22.

Brito, J.C., del Barrio, G., Stellmes, M., Pleguezuelos, J.M. & Saarinen, J. (2021). Drivers of change and conservation needs for vertebrates in drylands: an assessment from global scale to Sahara-Sahel wetlands. *European Zoological Journal* 88: 1103-1129.

Brito, J.C., Godinho, R., Martínez-Freiría, F., Pleguezuelos, J.M., Rebelo, H., et al. (2014). Unravelling biodiversity, evolution and threats to conservation in the Sahara-Sahel. Biological Reviews 89: 215-231.

Demongin, L. (2016) Identification Guide to Birds in the Hand. Privately published, Beauregard-Vendon, pp. 392.

Dinerstein, E., Olson, D., Joshi, A., Vynne, C., Burgess, N.D., et al. (2017). An ecoregion-based approach to protecting half the terrestrial realm. BioScience 67: 534-545.

GBIF.org (2022). Global Biodiversity Information Faculty (GBIF) Occurrence Download. Downloaded on 13 October 2022. https://doi.org/10.15468/dl.csm5ua

Heikkinen, R.K., Luoto, M.L., Araújo, M.B., Virkkala R., Thuiller, W. & Sykes, M.T. (2006). Methods and uncertainties in bioclimatic envelope modelling under climate change. *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* 30: 751-777.

Jennings, M.C. (2010) Atlas of the Breeding Birds of Arabia. Fauna of Arabia, vol. 25. King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh, pp. 772.
Karger, D.N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H. et al. (2017). Climatologies at high resolution for the Earth land surface areas. Scientific Data 4: 170122.
KSA-Kingdom of Saudi Arabia (2020). Vision 2030. Kingdom of Saudi Arabia.
Mbogga, M.S., Wang, X. & Hamann, A. (2010). Bioclimate envelope model predictions for natural resource management: dealing with uncertainty. *Journal of Applied Ecology* 47: 731-740.
Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., da Fonseca, G.A.B. & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853–858.
Porter, R., & Aspinall, S. (2013). Birds of the Middle East. 2nd Edition, Christopher Helm, London, pp. 384.
Prum, R. O. (2008). 'Who's Your Daddy?'. Science. 322 (5909): 1799–1800. doi:10.1126/science.1168808. PMID 19095929. S2CID 206517571.
Svensson, L. (2023) Identification Guide to European Passerines. 5th Edition, Lullula Förlag, Stockholm.
Symes, A., Taylor, J., Mallon, D., Porter, R., Simms, C. and Budd, K. (2015). The Conservation Status and Distribution of the Breeding Birds of the Arabian Peninsula. Cambridge, UK and Gland, Switzerland: IUCN, and Sharjah, UAE: Environment and Protected Areas Authority.
Weather Spark (2023). Climate and Average Weather Year Round in Al-`Ula, Saudi Arabia. https://weatherspark.com/y/100173/Average-Weather-in- Al-%60Ula-Saudi-Arabia-Year-Round.
WTO-World Tourism Organization (2020). AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism. UNWTO, Madrid.
Zhang, X., Liu, L., Chen, X., Gao, Y., Xie S, & Mi, J. (2021). GLC_FCS30: global land-cover product with fine classification system at 30m using time-series Landsat imagery. *Earth System Science Data* 13: 2753-2776.

12. الفهرس

ا
أبلق أبقع 138, 139, 162
أبلق أبيض قنة 135, 139, 161
أبلق أسود الذنب 133, 161
أبلق أغشى شرقي 19, 137, 139, 162
أبلق حزين شرقي 20, 136, 139, 161
أبلق درجي 20, 134, 138, 161
أبلق شمالي 20, 134, 138, 161
أبلق صحراوي 137, 139, 162
أبلق كردي 135, 138, 161
أبلق مقلنس 20, 136, 139, 161
أكبد أسود تاج 102, 106, 159
السبد النوبي 20, 46, 156
النعام الشائع 36, 156

ب
باشق أوراسي 19, 20, 78, 158
باشق مشرقي 77, 78, 79, 158
برقش 20, 132, 133, 161
برقش أحمر 132, 161
بلبل أغشى 20, 112, 160
بلشون أرجواني 20, 52, 55, 157
بلشون بقر غربي 53, 157
بلشون ليل أرأس 54, 55, 157
بلشون مذهب 20, 53, 157
بلنصي عربي 20, 124, 125, 161
بومة الصحراء 19, 20, 59, 157
بومة صحراوية 19, 20, 59, 157
بيدق آسيوي 77, 158

ت
تبشر 20, 142, 162
تمير عربي 20, 141, 162, 165
تمير فلسطيني 140, 162
تمير نيلي 140, 162

ث
ثبج فاتح 58, 157

ج
جشنة شجرية 146, 162
جشنة صحماء 20, 147, 162

ح
حجل رملي 38, 39, 156
حجل شائع 20, 37, 39, 156
حجل عربي 19, 20, 37, 39, 156
حدأة سوداء 20, 80, 158
حسون صحراوي 20, 152, 162
حسون كزبري 20, 151, 162
حسون ورد سينائي 150, 151, 162
حسون ورد شائع 150, 162
حمحم 20, 40, 43, 156
حمرة صبغاء 19, 101, 106, 159
حمرة صحراوية 20, 101, 106, 159
حميراء سوداء 20, 130, 161
حميراء شائعة 19, 20, 130, 161

خ
خطاف رملي 19, 20, 110, 111, 160
خطاف عجز 108, 111, 160

د
دخلة شائعة 115, 160
دخلة شجيرية 113, 160
دخلة صفصافية 20, 115, 117, 160
دخناء أوراسية 20, 114, 160
دخناء زيتونية شرقية 19, 20, 114, 160
دراج شائع 57, 157
درة إسكندرية 92, 93, 159
درة مطوقة 20, 92, 159

درسة قمحية 162
دغناش أمغر 96, 99, 159
دغناش داوري 96, 99, 159
دغناش شامي 98, 99, 159
دغناش مبرقع 98, 159

ذ
ذعرة بيضاء 149, 162
ذعرة رمداء 148, 162
ذعرة صفراء 19, 20, 148, 162

ر
رخمة 13, 64, 157
رفراف أصدر 20, 84
رفراف شائع 20, 83, 158

ز
زرقاء زور 20, 128, 161
زرق شائع 62, 63, 157
زوراء شائعة 19, 123, 161
زوراء صغيرة 120, 123, 160

س
سبد أوروبي 45, 46, 156
سبد مصري 20, 45, 46, 156
سقاوة 81, 82, 158
سمامة ألبية 47, 48, 156
سمامة شائعة 47, 48, 156
سماني شائعة 20, 38, 39, 156
سمنة صخرية زرقاء 19, 20, 131, 161
سُمْنَة مغردة 161
سنونو أحمر عجز 108, 111, 160
سنونو شائع 19, 20, 109, 111, 160
سوادية 20, 127, 161
سويداء 20, 143, 162

ش
شاهين 91, 159
شقراق أوروبي 20, 87, 158
شوالة 20, 126, 127, 161
شويهين أوراسي 90, 159

ص
صائد ذباب أرقط 128, 129, 161
صدى 19, 20, 58, 60, 157
صرارة 19, 20, 70, 73, 158
صُرَد صغير 97, 99, 159
صُرَد كبير 19, 20, 159
صفارية أوراسية 20, 93, 159
صقر أسحم 19, 20, 89, 90, 159

ض
ضوعة 19, 20, 124, 125, 161

ع
عصفور إسباني 19, 162
عصفور دوري 144, 162
عصفور صخري شاحب 145, 162
عقاب بونلية 69, 72, 158
عقاب خدارية 69, 158
عقاب رقطاء كبرى 67, 71, 158
عقاب سهبية 19, 29, 67, 71, 158
عقاب مذهبة 20, 68, 158
عقاب مسيرة 20, 70, 73, 158
عقاب ملكية شرقية 68, 158
عقيب العسل أوروبية 157
عقيب العسل شرقية 63, 157
عقيب شائعة 80, 82, 158
عندليب 126, 129, 161
عوسق 10, 20, 89, 159
عوهق جرفي أوراسي 109, 160
عوهق جرفي فاتح 110, 111, 160

غ
غداف 20, 94, 159
غراب أدرع 19, 20, 94, 159
غرنوق أبيض صغير 54, 55, 157

ف
فاختة أفريقية 42, 156
فاختة النخيل 41, 43
فاختة أوراسية 41, 43, 156
فرفر شائع 20, 50, 51, 157
فضي منقار أفريقي 20, 142, 162

ق
قارية أوروبية 86, 158
قارية خضراء 20, 85, 86, 158
قارية زرقاء الخدين 20, 85, 86, 158
قبرة الصحراء المقرنة 20, 104, 107, 160
قبرة شائعة 107, 160
قبرة شدقاء 100, 159
قبرة صبيعاء صغيرة 20, 107, 159
قبرة صبيعاء عربية 107, 159
قُبَّرة صُبَيْعاء كبيرة 20, 104, 107, 160
قبرة عربية 106, 159
قراع عربي 20, 88, 159
قطقاط أشوك 20, 56, 157
قمري أوروبي 20, 42, 156

ك
كدرية حجازية 19, 20, 44, 156
كعيت 112, 160

ل
لقلق أبيض غربي 50, 51, 157
لقلق أسود 51, 157
لَوَّاء أوراسي 87, 88, 158

م
ماينا شائع 20, 125, 161
مُرْزَة بغثاء 74, 158
مرزة مستنقعية 19, 74, 158
مرزة مونتجوية 75, 158
مكاء 19, 100, 159

ن
نسر آذن 66, 157
نسر أوراسي 19, 20, 65, 66, 157
نسر مسود 20, 65, 157
نعَّار عربي 152, 162
نقشارة سيبيرية 19, 116, 117, 160
نقشارة صفراء حاجب 160
نمنمة ذنوب 20, 113, 160

ه
هازجة حدائقية 19, 118, 122, 160
هازجة رأساء 20, 120, 123, 160
هازجة سردينية 19, 121, 123, 161
هازجة صحراوية آسيوية 19, 20, 119, 122, 160
هازجة عربية 20, 119, 122, 160
هازجة مغردة شرقية 121, 123, 161
هازجة مقلنسة أوراسية 118, 122, 160
هامة 20, 61, 157
هدهد أوراسي 83, 84, 158

و
وقواق أرقط كبير 49, 156

ي
يمامة برية 19, 40, 43, 156

A

Accipiter badius 77, 78, 79, 158
Accipiter brevipes 77, 78, 79, 158
Accipiter nisus 78, 79, 158
Acridotheres tristis 125, 161
Acrocephalus scirpaceus 114, 160
Aegypius monachus 65, 66, 157
Alaemon alaudipes 100, 106, 159
Alaudala rufescens 103, 107, 159
Alcedo atthis 83, 84, 158
Alectoris chukar 37, 39, 156
Alectoris melanocephala 37, 39, 156
Alexandrinus krameri 92, 93, 159
Ammomanes cinctura 101, 106, 159
Ammomanes deserti 101, 106, 159
Ammoperdix heyi 38, 39, 156
Anthus campestris 147, 162
Anthus cervinus 146, 162
Anthus trivialis 146, 162
Apus apus 47, 48, 156
Apus pallidus 48, 156
Aquila chrysaetos 68, 72, 158
Aquila fasciata 69, 72, 158
Aquila heliaca 68, 71, 158
Aquila nipalensis 67, 71, 158
Aquila verreauxii 69, 72, 158
Ardea cinerea 52, 55, 157
Ardea purpurea 52, 55, 157
Ardeola ralloides 53, 157
Argya squamiceps 124, 125, 161
Athene noctua 58, 60, 157

B

Bubo ascalaphus 59, 60, 157
Bubulcus ibis 53, 55, 157
Bucanetes githagineus 151, 162
Buteo buteo 29, 80, 82, 158
Buteo rufinus 81, 82, 158

C

Calandrella brachydactyla 104, 107, 160
Calandrella eremica 103, 107, 159
Caprimulgus aegyptius 45, 46, 156
Caprimulgus europaeus 45, 46, 156
Caprimulgus nubicus 46, 156
Carpodacus erythrinus 150, 151, 162
Carpodacus synoicus 150, 151, 162
Carpospiza brachydactyla 145, 162
Cecropis daurica 108, 111, 160
Cercotrichas galactotes 126, 127, 161
Cercotrichas podobe 127, 161
Ciconia ciconia 50, 51, 157
Ciconia nigra 51, 157
Cinnyris hellmayri 141, 162
Cinnyris osea 140, 141, 162
Circaetus gallicus 70, 73, 158
Circus aeruginosus 74, 158
Circus macrourus 74, 76, 158
Circus pygargus 75, 158
Clamator glandarius 49, 156
Clanga clanga 67, 71, 158
Columba livia 40, 43, 156
Coracias garrulus 87, 88, 158
Corvus rhipidurus 94, 95, 159
Corvus ruficollis 94, 95, 159
Coturnix coturnix 38, 39, 156
Crithagra rothschildi 152, 153, 162
Curruca cantillans 121, 123, 161
Curruca communis 122, 123, 161
Curruca curruca 120, 123, 160
Curruca leucomelaena 119, 122, 160
Curruca melanocephala 121, 123, 161
Curruca mystacea 120, 123, 160
Curruca nana 119, 122, 160
Cursorius cursor 57, 157

D

Delichon urbicum 108, 111, 160
Dendropicos dorae 88, 159

E

Egretta garzetta 54, 55, 157
Elanus caeruleus 62, 63, 157
Emberiza calandra 153, 162
Emberiza striolata 154, 162
Eremalauda eremodites 102, 106, 159
Eremophila bilopha 104, 107, 160
Eremopterix nigriceps 102, 106, 159
Euodice cantans 142, 143, 162

F

Falco concolor 89, 90, 159
Falco peregrinus 29, 91, 159
Falco subbuteo 90, 159
Falco tinnunculus 89, 90, 159

G

Galerida cristata 105, 107, 160
Gallinula chloropus 50, 51, 157
Gyps fulvus 65, 66, 157

H

Halcyon smyrnensis 84, 158
Hedydipna metallica 140, 141, 162
Hieraaetus pennatus 70, 73, 158
Hirundo rustica 109, 111, 160
Hypocolius ampelinus 143, 162

I

Iduna pallida 114, 160

J

Jynx torquilla 87, 88, 158

L

Lanius collurio 96, 99, 159
Lanius excubitor 97, 159
Lanius isabellinus 96, 99, 159
Lanius minor 97, 99, 159
Lanius nubicus 98, 99, 159
Lanius senator 98, 99, 159
Luscinia luscinia 129, 161
Luscinia svecica 128, 129, 161

M

Merops apiaster 86, 158
Merops cyanophrys 85, 86, 158
Merops persicus 85, 86, 158
Milvus migrans 80, 82, 158
Monticola solitarius 131, 161
Motacilla alba 149, 162
Motacilla cinerea 148, 149, 162
Motacilla flava 148, 149, 162
Muscicapa striata 128, 129, 161

N

Neophron percnopterus 64, 157
Nycticorax nycticorax 54, 55, 157

O

Oena capensis 40, 43, 156
Oenanthe deserti 137, 139, 162
Oenanthe hispanica 137, 139, 162
Oenanthe isabellina 134, 138, 161
Oenanthe leucopyga 135, 139, 161
Oenanthe lugens 136, 139, 161
Oenanthe melanura 133, 161
Oenanthe monacha 136, 139, 161
Oenanthe oenanthe 134, 138, 161
Oenanthe pleschanka 138, 139, 162
Oenanthe xanthoprymna 135, 138, 161
Onychognathus tristramii 124, 125, 161
Oriolus oriolus 93, 159
Otus brucei 58, 60, 157

P

Palaeornis eupatria 92, 93, 159
Passer domesticus 144, 145, 162
Passer hispaniolensis 144, 145, 162
Pernis apivorus 62, 63, 157
Pernis ptilorhynchus 63, 157
Phoenicurus ochruros 130, 131, 161
Phoenicurus phoenicurus 130, 131, 161
Phylloscopus collybita 115, 117, 160
Phylloscopus inornatus 116, 117, 160
Phylloscopus tristis 116, 117, 160
Phylloscopus trochilus 115, 117, 160
Ploceus galbula 142, 143, 162

Prinia gracilis 113, 160
Pterocles lichtensteinii 44, 156
Ptyonoprogne obsoleta 110, 111, 160
Ptyonoprogne rupestris 109, 111, 160
Pycnonotus leucotis 112, 160
Pycnonotus xanthopygos 112, 160

R
Ramphocoris clotbey 100, 106, 159
Rhodospiza obsoleta 152, 153, 162
Riparia riparia 110, 111, 160

S
Saxicola rubetra 132, 133, 161
Saxicola torquatus 132, 133, 161
Scotocerca inquieta 113, 160
Spilopelia senegalensis 41, 43, 156
Streptopelia decaocto 41, 43, 156
Streptopelia roseogrisea 42, 43, 156
Streptopelia turtur 42, 43, 156
Strix hadorami 59, 60, 157
Struthio camelus 36, 156
Sylvia atricapilla 118, 122, 160
Sylvia borin 118, 122, 160

T
Tachymarptis melba 47, 48, 156
Torgos tracheliotos 66, 157
Turdus philomelos 126, 127, 161
Tyto alba 61, 157

U
Upupa epops 83, 84, 158

V
Vanellus spinosus 56, 157